

تنوع ژنتیکی بخشی از ذخائر توارثی برنج ایرانی (*Oriza Sativa L.*) بر اساس صفات مورفولوژیک

خلیل زینلی نژاد^۱، آفافخر میرلوحی^۱، قربانعلی نعمتزاده^۲ و عبدالمجید رضایی^۱

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ۱۰۰ ژنوتیپ برنج بر اساس صفات مورفولوژیک و گروه‌بندی آنها، آزمایشی در قالب طرح لاتیس ساده در مزرعه مؤسسه تحقیقات کشاور (رشت) در سال ۱۳۷۷ انجام شد. ژنوتیپ‌ها که اکثرًا متعلق به منطقه شمال کشاور و استان اصفهان بودند، بر اساس صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد، در مزرعه ارزیابی شدند. ژنوتیپ‌ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری ($p < 0.01$) داشتند. خسایب تنوع ژنتیکی و ژنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود که بیانگر وجود تنوع بالا در صفات مورد بررسی می‌باشد. تجزیه عامل‌ها سه عامل را معرفی نمود که بیش از ۹۰ درصد از تنوع کل را توجیه نمودند. عوامل اول و سوم در ارتباط با ظرفیت مخزن و عامل دوم در ارتباط با تیپ گیاه بود و با توجه به بار عامل‌ها به ترتیب تعداد دانه، تیپ، ساختار گیاه و شکل دانه نام‌گذاری شدند. در تجزیه خوشای ژنوتیپ‌ها بر اساس «معیار توان سوم خوشی‌ها» و «آزمون T^2 کاذب هوتلینگ» در چهار گروه جای گرفتند. تجزیه واریانس صفات برای گروه‌ها نشان داد که تفاوت بین گروه‌های مختلف از نظر اکثر صفات بسیار معنی دار بود.

واژه‌های کلیدی: برنج (*Oryza sativa L.*), تنوع ژنتیکی، تجزیه عامل‌ها، تجزیه خوشای

مقدمه

محدود، مانند زمین، آب، انرژی، نیروی کار و خزانه‌زنی پاسخ داده شود^(۱)). نقش متخصصین به نژادی نسبت به سایر گروه‌های علمی درگیر در این عرصه بسیار مهم و اساسی است، زیرا افزایش تولید برنج باید، همچنان بر مبنای افزایش عملکرد صورت بگیرد. برای رسیدن به این هدف به ارقامی با پتانسیل

برنج بعد از گندم مهم‌ترین گیاه زراعی دنیا و غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان است. بیش از ۹۰ درصد برنج دنیا در آسیا تولید و در همانجا مصرف می‌شود که بیانگر نقش مهم آن در امنیت غذایی مردم آسیاست. تقاضا برای تولید بیشتر باید با منابع

-
۱. به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشیار و استاد زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 ۲. استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران، ساری

دی و همکاران(۱۰) تنوع ژنتیکی برای عملکرد و یازده صفت مرتبط با آن را در ۲۸ رقم برنج ، برای حالت کشت مستقیم و نیز در شرایط نشاء کاری بررسی کرده و تفاوت معنی داری بین ژنتیپ‌ها از نظر کلیه صفات در هر دو شرایط کشت مشاهده کردند. ژنتیپ‌ها در شرایط کشت مستقیم و نشاء کاری به ترتیب در ۵ و ۶ گروه قرار گرفتند و هیچ ارتباطی بین توزیع جغرافیایی و تنوع ژنتیکی آنها وجود نداشت. نوریزدان(۷) در بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده‌های برنج بومی منطقه اصفهان بر اساس صفات مورفولوژیک، تنوع بالایی بین ژنتیپ‌ها مشاهده کرد و در تجزیه عامل‌ها، سه عامل پنهانی مؤثر بر عملکرد به نام عامل تعداد، عامل ساختار و عامل اندازه را شناسایی نمود که بیش از ۹۸٪ تنوع را توجیه می‌کردند. ژنتیپ‌های مورد مطالعه در تجزیه کلاستر، در سه گروه قرار گرفتند. بابائیان جلوه‌دار و همکاران(۳) در بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی برنج‌های بومی مازندران، تنوع بالایی برای صفات مورد مطالعه، گزارش نمود و در گروه‌بندی ژنتیپ‌ها مشاهده نمودند که تنوع ژنتیکی عمدتاً از تنوع جغرافیایی پیروی نمی‌کرد. قنادها و همکاران(۵) در بررسی تنوع ژنتیکی و تأثیر صفات مورفولوژیکی بر روی عملکرد ارقام بومی گیلان، مشاهده نمودند که ژنتیپ‌ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی دارای اختلاف معنی داری بودند. بیشترین ضریب تغییرات ژنتیکی مربوط به صفات تعداد دانه پوک در پانیکول و نسبت طول به عرض برنج قهوه ای بود. تجزیه عامل‌ها، پنج عامل مستقل اصلی را که حدوداً ۷۶٪ از تنوع کل را توجیه می‌نمودند، آشکار کرد و در تجزیه کلاستر، ارقام در هفت گروه قرار گرفتند. شارما و همکاران (۱۷) در بررسی تنوع ژنتیکی ۱۷ ژنتیپ برنج آپلندر براساس ۱۱ صفت، ژنتیپ‌های مورد بررسی را در ۵ گروه قرار دادند و از معیار فاصله درون و بین گروه‌ها برای انتخاب والدین در برنامه‌های اصلاحی استفاده کردند. سو و همکاران (۲۰) در مطالعه تنوع ژنتیکی ۱۵۲ ژنتیپ برنج علفی (Weedy rice) از ۱۰ کشور جهان براساس ۶ صفت مورفو-فیزیولوژیکی و ۱۴ مکان آیزو زایمی و با به کارگیری تجزیه و

عملکرد بالاتر، مقاوم به آفات و بیماری‌ها و تنش‌های محیطی نیاز است (۱۴). شناسایی صفات مهم در گونه‌های گیاهی که در سازگاری، عملکرد و کیفیت نقش دارند و ارزیابی پتانسیل ژنتیکی صفات فوق، و همچنین جستجوی منابعی از ژن‌ها برای استفاده در برنامه‌های اصلاحی و انتقال ژن‌های مطلوب به ارقام مورد نظر، از جمله راهکارهای اصلاح نباتات است. توجه به این اصول، بیانگر این واقعیت است که تنوع ژنتیکی، اساس و پایه کار اصلاح نباتات است. شناسایی و ارزیابی ذخایر تواریشی (ژرم پلاسم) برنج از نظر وجود ژن‌های مورد نظر، گامی بنیادین در این راه است (۱۴). دسترسی به چنین منابع ژنی، متخصصین به نژادی را قادر می‌سازد که به راحتی آنها را به ارقام تجاری انتقال دهند (۱). ارقام بومی اولیه (landrace) از گونه‌های *O. glaberrima*، *O. sativa*، *Oryzae* و جنس‌های خویشاوند در قبیله *Oryzeae* دربرگیرنده تنوع زیستی موجود در خزانه ژنی برنج هستند (۱۱). از طرف دیگر حجم بالای نمونه‌های نگهداری شده در مجموعه‌های ذخایر تواریشی برنج، مدیریت آن را با اشکال روبرو نموده است. به منظور حل این مشکل و نیز پاسخ به نیاز متخصصین به نژادی، ارزیابی ذخایر تواریشی و گروه‌بندی آنها، ضروری به نظر می‌رسد.

سینها و همکاران(۱۹) تنوع ژنتیکی بین ۳۰ رقم بومی برنج از ۹ ایالت در هند را بررسی کرده و بر اساس ده صفت اگر و مورفولوژیک، ارقام را در ۶ گروه قرار دادند. ۱۹ ژنتیپ در یک گروه قرار گرفتند و سه گروه نیز هر یک دارای تنها یک ژنتیپ بودند. ژنتیپ‌های مناطق شمال شرقی هند تنوع بیشتری نسبت به سایر مناطق نشان دادند و در پنج گروه از شش گروه وجود داشتند. به هر حال در این مطالعه هیچ گونه هم‌آهنگی بین تنوع جغرافیایی و ژنتیکی دیده نشد و صفاتی مانند تعداد ساخه ثانویه در خوشة، عملکرد در گیاه و تعداد دانه پر در خوشة، نقش مهم‌تری در تنوع کل نشان دادند. از این رو پیشنهاد نمودند که انتخاب والدین با فاصله ژنتیکی دور می‌تواند، هتروزیس بیشتری از نظر صفات یاد شده به وجود آورد.

۱۳۷۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان از دیدار بذر شده بودند) و بقیه از بانک ژن کشور بخش ژنتیک و ذخایر توارثی و مؤسسه تحقیقات برنج کشور تهیه شدند. نمونه‌های دریافتی از بانک ژن و مؤسسه تحقیقات برنج شامل ۶۲ نمونه از ارقام بومی و ۱۲ نمونه از ارقام اصلاح شده ایرانی و ۱۰ نمونه از ارقام خارجی بود. بذر پاشی در تاریخ ۲۹/۷/۷۱ در خزانه صورت گرفت. زمین اصلی نیز با سخنم و تسطیح آماده و هم‌زمان با تسطیح به مقدار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره به مزرعه داده شد. سپس الگوی مناسب برای طرح لاتیس ساده در زمین پیاده شد. برای هر رقم کرتی به مساحت ۲/۲۵ متر مربع در هر تکرار اختصاص یافت. نشاء کاری به روش دستی در اول و دوم خرداد ۱۳۷۷ صورت پذیرفت. هر کرت شامل پنج ردیف به فاصله ۲۰ سانتی‌متر بود و نشاء کاری روی ردیف‌ها با ۹ کپه به فاصله ۲۵ سانتی‌متر و سه گیاه در هر کپه انجام شد، به طوری که هر کرت دارای ۴۵ کپه بود. ۲۰ روز بعد از نشاء کاری، برای مبارزه با علف‌های هرز، وجین به صورت دستی صورت گرفت. صفات عرض برگ، طول برگ، طول ساقه، طول خوش، تعداد پنچه، قطر ساقه، تعداد سنبلچه در خوش، تعداد دانه پوک در خوش، شاخه‌بندی اولیه در خوش، طول دانه، عرض دانه، روز تا رسیدگی، وزن صد دانه و عملکرد بر اساس روش استاندارد ارزیابی برنج (SES) (۱۶) در هر کرت برای ۱۰ کپه، خوش و یا بذر تصادفی اندازه گیری شدند و میانگین آنها در محاسبات منظور گردید.

نخست مقادیر صفات اندازه گیری شده در قالب طرح لاتیس ساده مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. مزیت نسبی طرح لاتیس ساده نسبت به طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای کلیه صفات بررسی شد تا چنانچه این سودمندی برای برخی صفات کم باشد، تجزیه واریانس بر اساس طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار انجام گیرد (۸). اجزای مشکله واریانس، ضرایب تنوع ژنتیکی و ژنتیکی و هم‌چنین میزان وراشت پذیری عمومی صفات بر مبنای اجزای مشکله واریانس تعیین شدند. ضرایب همبستگی ژنتیکی بین صفات محاسبه شدند.

تحلیل چند متغیره، ژنتیپ‌های مورد بررسی را در چهار گروه قرار داده و سپس با به کار گیری نشانگرهای ریید و آیزو زایمی نحوه پیدایش هر یک از گروه‌ها را بررسی کردند. کوماری و فنگاسمی (۱۵) تنوع ژنتیکی بین ۶۲ ژنتیپ برنج از ۱۶ کشور جهان را بر اساس ۸ صفت موثر بر عملکرد بررسی کرده و ژنتیپ‌ها را در ۶ گروه قرار دادند و هیچ ارتباطی بین توزیع جغرافیایی و تنوع ژنتیکی مشاهده نکردند. صفاتی مانند عملکرد دانه در بوته و ارتفاع بوته، بالاترین نقش را در تنوع کل بر عهده داشتند. هم‌چنین بیان کردند که این صفات می‌توانند پایه‌ای برای انتخاب والدین برای تلاقی جهت تولید بالاترین هتروزیس باشند. سینگ و همکاران (۱۸) تنوع ژنتیکی ۴۰ ژنتیپ برنج را بر اساس ۱۰ صفت، بررسی کرده و ژنتیپ‌ها را در ۶ گروه قرار دادند. عملکرد دانه و ارتفاع بوته به ترتیب با ۴۰/۶٪ و ۱۶/۵٪ بیشترین سهم از تنوع کل را بر عهده داشتند. هم‌چنین پیشنهاد نمودند برای ایجاد جمعیت با تفرق خوب در برنامه اصلاحی ژنتیپ‌های گروه‌های با فاصله دورتر می‌توانند استفاده شوند. بنابر آنچه از منابع مختلف بررسی آید، در برنج، تنوع مطلوب و قابل قبولی در ذخایر توارثی از نظر اکثر صفات موجود است. با توجه به مطالب ذکر شده، هدف این مطالعه، بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از ژرم پلاسم برنج ایرانی از نظر صفات مورفولوژیک و چگونگی ارتباط میان این صفات از طریق تجزیه و تحلیل‌های چند متغیره و در نهایت گروه بندی این ذخایر ژنتیکی بود.

مواد و روش‌ها

این آزمایش در سال ۱۳۷۷ در مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) با عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه، طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۵ دقیقه، و هم‌چنین ارتفاع ۱۰-متر از سطح دریا و متوسط بارندگی سالانه ۱۴۴۱ میلی‌متر اجرا شد. بافت خاک مزرعه سیلتی کلی و اسیدیته آن ۷/۶-۷/۷ است. مواد مورد مطالعه شامل ۱۰۰ ژنتیپ بود که ۱۶ ژنتیپ از بین ارقام بومی اصفهان (که در سال ۱۳۷۵ به صورت تک بوته از مزارع کشاورزان جمع آوری و در سال

در صد معنی دار بود. از این رو نتیجه گیری شد که بین ژنتیپ‌ها از نظر این صفات تنوع زیادی وجود دارد. دامنه تغییرات گسترده نیز این مطلب را برای کلیه صفات تأیید می‌کند. در بین صفات مورد بررسی، صفت تعداد دانه پوک در خوش، بیشترین ضریب تنوع و صفت روز تا رسیدگی کمترین ضریب تنوع را دارا می‌باشدند. اله قلی پور و همکاران (۲) و همچنین نوریزدان (۷) در مطالعات خود روی برنج اظهار نمودند که صفت روز تا رسیدگی، دارای کمترین ضریب تنوع بود. برآورده اجزای واریانس و ضرایب تنوع ژنتیپی و فنتیپی صفات در جدول ۲ آورده شده است. ضرایب تنوع فنتیپی برای کلیه صفات از ضرایب تنوع ژنتیپی بزرگ‌تر بودند. چائوبی و ریچهاریا (۹) نشان دادند که در برنج عموماً ضرایب تنوع فنتیپی از ضرایب تنوع ژنتیکی بزرگ‌تر هستند. بیشترین و کمترین مقدار ضریب تنوع ژنتیکی، به ترتیب مربوط به تعداد دانه پوک در خوش و روز تا رسیدگی بود. ضرایب همبستگی ساده بین صفات در جدول ۳ مشخص است. ماتریس ضرایب همبستگی نشان می‌دهد که بین صفات مختلف همبستگی معنی داری وجود دارد. نوریزدان (۷) در مطالعه روی برنج همبستگی مثبت و معنی داری بین عرض با طول برگ، تعداد پنچه و روز تا رسیدگی با عملکرد، عرض دانه با وزن صد دانه و همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین طول ساقه و وزن هزار دانه به دست آورد. اله قلی پور و همکاران (۲) در مطالعه روی برنج، همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانه در خوش با تعداد شاخه بندی اولیه در خوش به دست آورده‌اند. چائوبی و ریچهاریا (۹) در مطالعه روی برنج همبستگی مثبت و معنی داری بین طول ساقه با طول خوش و همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین طول ساقه و طول خوش با تعداد پنچه بارور به دست آورده‌اند. نتایج فوق توافق زیادی با همبستگی‌های به دست آمده در این تحقیق دارند.

نتایج تجزیه عامل‌ها در جدول ۴ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود سه عامل پنهانی در مجموع ۹۰ درصد از تنوع کل را توجیه نمود که سهم آنها

به منظور بررسی روابط علت و معلولی بین صفات، شناخت صفاتی که بیشترین نقش را در عملکرد ایفا می‌نمایند و نیز شناسایی عوامل پنهانی مؤثر بر عملکرد از تجزیه عامل‌ها به روش حداکثر درستنمایی استفاده شد و عوامل به دست آمده با روش وریماکس دوران داده شدند. در نهایت به منظور گروه‌بندی ژنتیپ‌ها، از تجزیه خوش‌های به روش وارد (Ward) یا حداقل واریانس و بر مبنای مربع فاصله اقلیدس به عنوان معیار فاصله استفاده شد و بر اساس آزمون T^2 کاذب هوتلینگ (Pseudo Hotelling T^2 Test) و معیار توان سوم خوش‌های (Cubic Clustering Criterion) به علت متفاوت بودن واحد اندازه گیری صفات و همچنین تفاوت زیاد در انحراف معیار صفات با واحد اندازه گیری مشابه نخست داده‌ها استاندارد و سپس برای گروه‌بندی ژنتیپ‌ها به کار گرفته شدند (۱۲ و ۱۳). به منظور کسب اطمینان بیشتر به صحت گروه‌بندی و به منظور مقایسه میانگین گروه‌ها از نظر صفات مختلف، تجزیه واریانس بر اساس طرح کاملاً تصادفی نامتعادل انجام گردید، به طوری که گروه‌ها به عنوان تیمار و ژنتیپ‌های داخل هر یک از گروه‌ها به عنوان تکرار در نظر گرفته شدند (۸). محاسبات آماری با استفاده از نرم افزارهای SAS و SPSS انجام گردید.

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس طرح لاتیس نشان داد که مزیت نسبی این طرح نسبت به طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای کلیه صفات اندازه گیری شده کم است. بنابراین برآورده واریانس‌ها و امیدهای ریاضی از طریق تجزیه واریانس و امیدهای ریاضی طرح بلوک‌های کامل تصادفی صورت پذیرفت. ضریب تنوع، کمترین و بیشترین مقدار و شماره ژنتیپ‌های مربوط، دامنه و میانگین صفات و میانگین مربعات متتابع مختلف تغییر در جدول ۱ نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود اختلاف بین ژنتیپ‌ها برای کلیه صفات در سطح احتمال ۱

جدول ۱. میانگین مربuat منابع مختلف تغییر در تعزیزه و ایجاد، ضرایب تنوع صفات، دامنه، شماره ژنوتیپ های مربوط به دامنه و میانگین صفات مختلف درصد ژنوتیپ برنج

میانگین مربuat	دامنه						صفات
	میانگین	حداکثر	حداقل	حداکثر	حداقل	شماره ژنوتیپ های مربوط به دامنه	
۱۱۲۰±۱۰۸	۱۰	۶	۰	۱۱۷۵	۱/۶۳	۱۱۷۵	عرض برگ (سانتی متر)
۵/۱۱۹۸±۰۴۳۷۳۴	۲۲	۶	۱۱۲۸۲۰	۵۳/۹۵	۱۱۱۹۹	۹/۱۶۸۴	* ۵۴/۰۳۳۱
۱/۰۵۰۹±۰۱۰۰۷	۷۷	۲۸	۵۳/۷۰	۲۸/۲۰	۱۴/۷۱	۲۰/۹۲۶۳	** ۴۷/۷/۹۹۳۳
۲/۰۲۹۰±۰۲۵۵۲۲	۱۹	۳۳	۱۷/۵۰	۳۲/۱	۹/۰۷	۲۱۲۵۸۳	** ۱۰/۴۹۰۴
۲/۰۵۴۸±۱۲/۳۷	۹۶	۱۹	۸/۲۰	۲۳/۸۰	۱۹/۰۵	۲/۶۷۳۷	** ۱۲/۹۸۴۶
۰/۰۵۷۴±۰/۰۱	۹۴	۱۰	۳/۶۵	۷/۴۵	۱۱/۱۲	۱۰/۰۴۹۶	* ۸/۶۴۷۸
۱/۰۲۲۰±۱۱/۴۳	۸۲	۳۴	۸/۰/۰	۲۱/۹/۰۰	۲۰/۷۱	۱۴۱۱۲۰۲۵	** ۱۴۸۱/۹۳۵۹
۰/۰۷۶۰±۰/۰۷	۷۶	۷۴	۷/۰۳	۳۱/۰۰	۲۱/۰۰	۱۴۸/۸۳۲۴	* ۰/۵۷۰۲
۱/۰۳۸۵±۰/۰۸/۸	۷۳	۱۰	۰/۸۰	۱۲/۲۰	۱۰/۷۲	۰/۴۴۶۲	** ۱/۳۸۳۲
۰/۰۸۰۵±۰/۰۹/۱	۲	۰	۶/۱۶۵	۱۱/۰۰	۹/۰۹۳	۰/۰۸۴۰۸	** ۱/۱۵۷۲
۰/۰۲۳۰±۰/۰۲۰	۵۷	۳۲	۲/۱۵	۳/۰۵	۱۱/۹۸	۰/۰۲۰۰	** ۰/۲۰۵۹
۰/۰۰۰۰±۱۱/۱۷	۸۶	۲۰	۱۱۲/۰۰	۱۳۸/۰۵	۴/۲۲	۳/۲۷۷۷	** ۰/۰۱۸۲
۰/۰۷۰۷±۰/۰۷۰	۵۷	۸۲	۱/۶۳	۲/۰۸	۱۰/۹۳	۰/۰۱۶۹	** ۰/۰۱۸۶
۰/۰۲۸۵±۰/۰۸/۸	۳۳	۲۴	۳/۰/۰	۷/۰/۰۰	۱۷/۸۰	۱۳۲۲۱/۶۱۲۳	* ۱/۷۱۴۴۷۷
							عملکرد (۱ بوده) (کرم)
							۷۹۳۸۰۰

* و ** به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد
درجات آزادی تکرار ژنوتیپ و خطي به ترتیب ۱، ۹۹ و ۹۹

جدول ۲. بروآرد اجزای واریانس، ضرایب تنشی و توارث پذیری عمومی صفات مورد مطالعه

ردیف	نام و نشانه	دسته بندی	توضیحات
۱	برآورد اجرای واریانس	ضریب تنوع	
۲	وراثت پذیری عمومی٪	فرمختی	فرمختی
۳	فرمختی	ژنتیکی	زنختشی
۴	زنختشی	محضی	فرمختی
۵	محضی	فرمختی	عرض برگ (سانتی متر)
۶	فرمختی	فرمختی	طول برگ (سانتی متر)
۷	فرمختی	فرمختی	طول ساقه (سانتی متر)
۸	فرمختی	فرمختی	طول خوش (سانتی متر)
۹	فرمختی	فرمختی	تعداد پنجه
۱۰	فرمختی	فرمختی	قطر ساقه (میلی متر)
۱۱	فرمختی	فرمختی	تعداد دانه در خوش
۱۲	فرمختی	فرمختی	تعداد دانه پوک در خوش
۱۳	فرمختی	فرمختی	شانه بندی اویله در خوش
۱۴	فرمختی	فرمختی	طول دانه (میلی متر)
۱۵	فرمختی	فرمختی	عرض دانه (میلی متر)
۱۶	فرمختی	فرمختی	روز تا رسیدگی
۱۷	فرمختی	فرمختی	وزن صد دانه (گرم)
۱۸	فرمختی	فرمختی	عملکرد (۲۱ بوته) (گرم)

جدول ۳. ضرایب همبستگی نزدیکی صفات مورد مطالعه در ۱۰۰ زنگی برج

	صفات	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۱. عرض برج		۰/۲۲۶۴۰													
۲. طول برج		-۰/۰۵۴													
۳. طول ساده		-۰/۰۵۱													
۴. طول خوش		-۰/۰۳۱													
۵. تعداد پچه		-۰/۱۶۳													
۶. قطر ساده		-۰/۰۴۸۱													
۷. تعداد دانه در خوش		-۰/۰۷۱۶													
۸. تعداد دانه بوج در خوش		-۰/۰۴۷۷													
۹. شاخه بندی اویله در خوش		-۰/۰۵۵۵													
۱۰. تعداد دانه در خوش		-۰/۰۷۱۶													
۱۱. عرض دانه		-۰/۰۴۰۰													
۱۲. طول دانه		-۰/۰۲۶۳													
۱۳. وزن صد دانه		-۰/۰۰۶۸													
۱۴. عملکرد (۲۱ برته)		-۰/۰۰۲													

جدول ۴. بار عامل‌های دوران یافته، نسبت واریانس توجیه شده توسط هر عامل، نسبت تجمعی واریانس توجیه شده و ریشه‌های مشخصه ژنتیکی

بار عامل‌ها			صفات
سوم	دوم	اول	
-۰/۲۶۰	۰/۰۷۳	۰/۷۹۵	عرض برگ
۰/۰۶۳	۰/۷۴۶	۰/۲۸۰	طول برگ
-۰/۰۳۴	۰/۸۷۰	-۰/۱۱۷	طول ساقه
-۰/۱۵۸	۰/۶۰۷	۰/۰۷۴	طول خوش
-۰/۲۵۵	-۰/۴۱۷	-۰/۰۵۵	تعداد پنجه
۰/۱۱۲	۰/۶۲۳	۰/۳۲۸	قطر ساقه
-۰/۰۵۱	۰/۱۲۳	۰/۹۱۰	تعداد دانه در خوش
-۰/۱۴۶	۰/۱۳۶	۰/۶۷۳	تعداد دانه پوک در خوش
۰/۰۷۸	۰/۰۷۹	۰/۶۵۱	شاخه‌بندی اولیه در خوش
-۰/۶۶۹	-۰/۱۴۰	-۰/۲۲۴	طول دانه
۰/۹۹۷	۰/۰۷۳	-۰/۰۰۱	عرض دانه
-۰/۰۳۸	-۰/۴۰۸	۰/۴۰۴	روز تا رسیدگی
۰/۳۷۰	-۰/۱۸۰	-۰/۲۳۱	وزن صد دانه
۰/۲۱	۰/۲۴	۰/۴۴	نسبت واریانس توجیه شده
۰/۹۰	۰/۶۸	۰/۴۴	جمع کل واریانس توجیه شده
۵/۱۵۲	۵/۷۵۰	۱۰/۰۵۲۳	ریشه مشخصه

خوش بلت و نیز قطور بودن ساقه (نه قوی بودن آن) که بیانگر صفات ارقام پابلند است، موجب حساسیت در برابر ورس و عدم کودپذیری و در نهایت کاهش عملکرد می‌شود. تعداد پنجه از مهم‌ترین صفات یک رقم برنج است^(۶) و بیانگر تعداد خوش در واحد سطح و از اجزای عملکرد می‌باشد. در مجموع این عامل را می‌توان در ارتباط با «تیپ و ساختار گیاه» نامگذاری نمود.

در عامل سوم صفاتی مثل عرض دانه و وزن صد دانه دارای بار عامل مثبت و طول دانه دارای بار عامل منفی می‌باشد. با توجه به کوچک بودن بار عامل وزن صد دانه نسبت به عرض و طول دانه، می‌توان گفت که این عامل در تعیین ابعاد دانه برنج نقش دارد و از آنجایی که عرض و طول دانه را در جهت عکس یکدیگر تغییر می‌دهد، پس بزرگی و حجم دانه تغییر نخواهد کرد. از این رو این عامل، عاملی در ارتباط با «شكل دانه» نامگذاری شد. شناسایی این عامل و همچنین تأثیر متفاوت آن بر طول و عرض دانه بی ارتباط با این مطلب نیست که در طی

به ترتیب ۴۴، ۲۴، ۲۱ درصد است. در عامل اول صفات عرض برگ، تعداد دانه در خوش، تعداد دانه پوک در خوش و تعداد شاخه اولیه در خوش همگی دارای بار عامل مثبت و بالای نسبت به سایر صفات بودند. این عامل را می‌توان در ارتباط با «تعداد دانه» دانست. در عامل دوم صفات طول ساقه، طول برگ، طول خوش و قطر ساقه دارای بار عامل مثبت و تعداد پنجه دارای بار عامل منفی معنی داری با عملکرد هستند در حالی که تعداد پنجه با عملکرد دارای همبستگی مثبت و معنی دار است. بین طول برگ و زاویه برگ در برنج همبستگی بالایی وجود دارد، یعنی برگ‌های بلند افقی تر و برگ‌های کوتاه، عمودی ترند و از آنجایی که آرایش و جهت برگ‌ها در فضای طریق تأثیر بر میزان نفوذ نور خورشید به داخل کانوپی، روی فتوستز و در نهایت بر عملکرد گیاه مؤثر است، ارقام با برگ‌های بلندتر، عملکرد کمتری خواهند داشت^(۴). همچنین ساقه، برگ و

طرح کاملاً تصادفی نامتعادل (جدول ۶) گروه‌بندی انجام شده را تأیید نمود . به طوری که چهار گروه حاصل از تجزیه کلاستر، از نظر کلیه صفات (به جز عرض دانه و وزن صد دانه) تفاوت معنی‌داری نشان دادند که بیانگر تنوع زیاد ژنتیک‌ها در بین گروه‌ها نسبت به داخل گروه‌هاست. گروه‌های اول تا چهارم به ترتیب دارای ۳۶، ۴۴، ۷، ۱۳ ژنتیک بودند. گروه اول عمدها شامل ارقام بومی مناطق شمالی کشور هستند. دو رقم از ارقام بومی اصفهان و نیز دو رقم خارجی (دولار و نورین ۲۲) در این گروه دیده شدند.


از ویژگی‌های این گروه می‌توان بر اساس جدول ۶، به زودرسی، تعداد کمتر شاخه اولیه در خوش، قطر کم ساقه و برگ‌هایی با عرض کم و طول متوسط اشاره کرد. گروه دوم بیشتر شامل ارقام بومی مناطق شمالی و ارقام بومی منطقه اصفهان و ارقام اصلاح شده‌ای مانند خزر، دشت و بخار می‌باشد. از ویژگی‌های این گروه می‌توان به ساقه و خوش بلنده، پنجه کمتر، طول و عرض متوسط برگ اشاره نمود. گروه سوم شامل دو رقم خارجی (اوندا و NP-۱۲۵) و پنج رقم از مناطق شمالی کشور است که دارای صفات بارزی چون عرض و طول برگ بالا، قطر ساقه زیاد و تعداد بالای دانه در خوش هستند. گروه چهارم شامل ارقام اصلاح شده ایرانی مانند نعمت، ندا، سپیدرود و چند لاین اصلاحی و نیز چهار رقم خارجی است. از ویژگی‌های این گروه می‌توان به عملکرد بالا، دیررسی، تعداد شاخه بندی اولیه بالا در خوش، طول برگ کوتاه و عرض برگ متوسط و نیز تعداد پنجه بالا و طول ساقه و خوش کوتاه اشاره نمود.

همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده است درسه گروه اول ۸۷ ژنتیک قرار دارد که همگی به‌جز ۴ ژنتیک خارجی و سه ژنتیک اصلاح شده ایرانی، از ارقام بومی ایران می‌باشند و گروه چهارم که شامل ۱۳ ژنتیک است، همگی خارجی و یا ارقام اصلاح شده ایرانی هستند. این الگوی تفکیک ژنتیک‌ها تا حدودی بیانگر پیروی الگوی تفکیک ژنتیکی از الگوی تفکیک جغرافیایی است و اگر چه هم آهنگی کاملی در این زمینه دیده نشد، ولی گزارش‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برای


ظهور ارقام جدید برنج تغییری در وزن دانه‌ها رخ نداده است و ارقام پرمحصلوی برنج دانه‌هایی با وزن متوسط حدود ۲۵ میلی‌گرم دارند^(۴).

براساس فرض‌های تجزیه عامل‌ها، عوامل پنهانی، مستقل از یکدیگرند، به عبارت دیگر تغییر یک عامل موجب تغییر در عوامل دیگر نخواهد شد در نتیجه می‌توان صفات مختلفی را که تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد، به‌طور هم‌زمان بهمود بخشید و در این صورت می‌توان برای رسیدن به عملکرد بالا و تیپ ایدآل به تقویت یا تضعیف یکی یا هر سه عامل پنهانی پرداخت و امید داشت که صفات تحت تاثیر هر یک از عوامل پنهانی، با تغییرات عوامل دیگر چهار تردید نخواهد شد و یا حداقل این تغییرات زیاد نخواهد بود. براساس نتایج پژوهش حاضر با تقویت عامل اول، می‌توان تعداد دانه در خوش و با تضعیف عامل دوم تعداد پنجه را افزایش داد و به بوته‌ای با تعداد دانه در خوش بیشتر و تعداد پنجه زیادتر رسید و هم‌زمان طول و یا عرض دانه را با تقویت و یا تضعیف عامل سوم تغییر داد و به تیپ ایدآل نزدیک شد. بدینهی است که رسیدن به تیپ ایدآل نیاز به آزمایش‌های جامع دارد و نتیجه تجزیه عامل‌های این تحقیق تنها ایده‌ای کلی را می‌تواند ارائه دهد.

تجزیه خوش ای ژنتیک‌ها در شکل ۱ نشان داده شده است. بر اساس نتایج آزمون^۲ کاذب هوتلینگ و معیار توان سوم خوش‌ها (C.C.C) که در جدول ۵ و شکل ۲ آمده است، ژنتیک‌ها در ۴ گروه قرار گرفتند.^۲ کاذب هوتلینگ (جدول ۵) برای پیوستن کلاسترها ۸ و ۲۲ و تشکیل ۵ کلاستر برابر ۱۰/۵ و نیز برای پیوستن کلاسترها ۱۱ و ۹ و تشکیل ۴ کلاستر برابر ۱۰/۶ است، در حالی که برای پیوستن کلاسترها ۵ و ۴ و تشکیل ۳ کلاستر مقدار این آمار با ۱۵/۳ افزایش می‌یابد که بیانگر عدم پیوستن و اتصال کلاسترها ۴ و ۵ و تشکیل ۳ کلاستر است، بنابراین ژنتیک‌ها در ۴ گروه باقی می‌مانند. بر اساس شکل ۲ که پلات مقادیر C.C.C در برابر تعداد کلاستر است، مشاهده شد که برای تعداد ۴ کلاستر نقطه اوج کوچکی وجود دارد که نشان دهنده تعداد مناسب گروه‌هاست. نتایج حاصل از تجزیه واریانس




شکل ۱. گروه‌بندی افراد بر اساس صفات مرفوژیک



ادامه شکل ۱

جدول ۵. تعداد خوشه و مقادیر مربوطه به T^2 کاذب هوتلینگ و C.C.C

تعداد خوشه	اتصال خوشه‌ها	C.C.C	کاذب هوتلینگ ^۲
۵	خوشه ۸	۲۲	۱۰/۵
۴	خوشه ۱۱	۹	۱۰/۶
۳	خوشه ۵	۴	۱۵/۳
۲	خوشه ۳	۶	۱۷/۰
۱	خوشه ۲	۷	۱۶/۱



شکل ۲. پلات مقادیر C.C.C در برابر تعداد کلاستر

نتیجه‌گیری

براساس نتایج حاصل از این پژوهش، تنوع ژنتیکی گستردگی بین ارقام از نظر صفات مورد بررسی وجود دارد، که حاکی از ارزشمند بودن این ذخایر و لزوم توجه بیشتر در حفظ، نگهداری و ارزیابی آنهاست. سه عامل پنهانی شناسایی شده درک بهتری از روابط بین صفات مورد بررسی و ارتباط بین اجزای عملکرد و ساختار مورفولوژیک و فیزیولوژیک را نشان داد. بدین صورت که عوامل اول و سوم بیشتر در ارتباط با ظرفیت مخزن

مثال کوماری و همکاران (۱۵)، دی و همکاران (۱۰)، سینها و همکاران (۱۹) و بابائیان جلودار و همکاران (۳) در بررسی‌های خود روی برنج، عدم هم‌آهنگی بین تنوع ژنتیکی و تنوع جغرافیایی را اعلام داشتند. از آنجایی که گروه چهارم با سه گروه اول فاصله ژنتیکی زیادی دارد می‌توان به انتخاب ژنوتیپ‌هایی از این گروه و ژنوتیپ‌هایی از سه گروه اول بسته به صفت مورد نظر به عنوان والدین در برنامه‌های اصلاحی اقدام نمود و انتظار هتروزیس بالایی را داشت.

جدول ۶. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین های صفات در گروه های حاصل از تجزیه خوشای در صد ژنتیک برج مورد در مطالعه

گروه ۴ میانگین	میانگین	گروه ۳		گروه ۲		گروه ۱		میانگین	میانگین ها داخل گروهها	میانگین ها بین گروهها	صفات
		گروه ۳	میانگین	گروه ۲	میانگین	گروه ۱	میانگین				
۱/۱۲b	a1/f۰	۱/۰۷bc	۱/۰۱c	۱/۰۵c	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷	۰/۰۵۷***	عرض پرگ
۲۵/۵۵d	۴۹/۲۵a	۴۶/۲۸b	۴۱/۳۹c	-	-	۱۱/۹۲۷	-	۰/۰۴۴**	-	۰/۰۴۴**	طول برگ
۷۵/۸۰c	۱۰/۵۷۲b	۱۱۲/۵۷a	۱۰/۵۷۲b	۱۰/۵۷۲a	۱۰/۵۷۲a	۹۷/۶۸۹	۹۷/۶۸۹	۰/۰۴۴**	۰/۰۴۴**	۰/۰۴۴**	طول ساقه
۲۲/۲۷c	۲۵/۲۴ab	۲۶/۵۸a	۲۴/۵۸a	۲۴/۵۸a	۲۴/۵۸a	۲/۷۳۸	۲/۷۳۸	۰/۰۳۳**	۰/۰۳۳**	۰/۰۳۳**	طول خوش
۱۰/۹۵a	۱۲/۷۸c	۱۲/۷۲c	۱۲/۷۲c	۱۲/۷۲c	۱۲/۷۲c	۴/۹۴۴	۴/۹۴۴	۰/۰۴۴**	۰/۰۴۴**	۰/۰۴۴**	تعداد پنج
۴/۰۲c	۵/۸۱a	۵/۲۹b	۴/۵۸c	۴/۵۸c	۴/۵۸c	۰/۰۲۹	۰/۰۲۹	۰/۰۴۰**	۰/۰۴۰**	۰/۰۴۰**	قطر ساقه
۱۳۲/۰۷b	۱۹۵/۱۱a	۱۳۲/۱۶b	۱۱۷/۹۳b	۱۱۷/۹۳b	۱۱۷/۹۳b	۳۹۹/۴۹۲	۳۹۹/۴۹۲	۱/۱۶۶/۱۹۴**	۱/۱۶۶/۱۹۴**	۱/۱۶۶/۱۹۴**	تعداد دانه در خوش
۱۲/۹۲b	۲۴/۲۷a	۱۲/۷۷b	۱۰/۵۳b	۱۰/۵۳b	۱۰/۵۳b	۲/۱۱۵	۲/۱۱۵	۰/۰۷۹/۹۱۳**	۰/۰۷۹/۹۱۳**	۰/۰۷۹/۹۱۳**	تعداد دانه پرک در خوش
۱۰/۷۱a	۹/۲۲۳b	۹/۱۰b	۷/۹۳b	۷/۹۳b	۷/۹۳b	۱/۰۵۹	۱/۰۵۹	۰/۰۵۰/۰	۰/۰۵۰/۰	۰/۰۵۰/۰	شانه بندی اولیه در خوش
۹/۳۴a	۸/۰۵b	۹/۰۷a	۸/۰۷a	۸/۰۷a	۸/۰۷a	۰/۷۲۰	۰/۷۲۰	۰/۰۸۰/۰	۰/۰۸۰/۰	۰/۰۸۰/۰	طول دانه
۲/۰۲	۲/۱۷	۲/۱۷	۲/۱۷	۲/۱۷	۲/۱۷	۰/۱۰۰	۰/۱۰۰	۰/۰۹۰/۰	۰/۰۹۰/۰	۰/۰۹۰/۰	عرض دانه
۱۲۶/۴۲a	۱۲۰/۰۰b	۱۱۷/۶۷bc	۱۱۶/۷۱c	۱۱۶/۷۱c	۱۱۶/۷۱c	۱/۰۸۵۸	۱/۰۸۵۸	۰/۰۵۳۸**	۰/۰۵۳۸**	۰/۰۵۳۸**	روز تا رسیدگی
۲/۰۱	۲/۷۶	۲/۰۱	۲/۰۱	۲/۰۱	۲/۰۱	۰/۰۷۰	۰/۰۷۰	۰/۰۱۳۹	۰/۰۱۳۹	۰/۰۱۳۹	وزن صد دانه
۰/۰۵۷۱a	۰/۰۵۷۱b	۰/۰۸۰۸b	۰/۰۴۴۶b	۰/۰۴۴۶b	۰/۰۴۴۶b	۰/۰۵۰۱	۰/۰۵۰۱	۰/۰۱۲۱**	۰/۰۱۲۱**	۰/۰۱۲۱**	عمده کرد (۲۱ برونه)

* مقایسه میانگین های گروهها به روش داکن در سطح اختصار ۵ درصد صورت گرفته است و در هر دو گروه میانگین که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشد از نظر آماری معنی دار نیست.

به ترتیب معنی دار در سطوح اختصار ۱ و ۵ درصد.

را حداکثر در ۴ گروه قرار داد و در صورت ارزیابی همه نمونه‌های موجود در بانک ژن برنج ایرانی، می‌توان بدون کاهش حجم نمونه‌ها، آنها را منظم کرد و یا این‌که نمونه‌ای از هر یک گروه‌ها گرفته و نسبت به ایجاد Core Collection اقدام نمود که هر یک زیرمجموعه‌ای از تنوع ژنتیکی برنج خواهد بود، که البته این کار نیاز به آزمایش‌های دقیق در چند سال و چند مکان دارد.

سپاسگزاری

بدین‌وسیله از کارشناسان و پرسنل مؤسسه تحقیقات برنج کشور به خاطر همکاری‌های همه جانبه تقدير و تشکر می‌شود.

و عامل دوم در ارتباط با منبع و کارایی گیاه در استفاده از منابعی مثل نور و کود است. توجه به این سه عامل پنهانی، محقق را به سمت تیپ ایدال در برنج نزدیک می‌کند زیرا در عوامل اول و سوم به صفات خوش و دانه و در عامل دوم به ساختار و تیپ گیاه توجه می‌شود. بنابراین، سه عامل پنهانی، افزایش عملکرد در برنج را منوط به توجه به تیپ ایدال و اصلاح صفات به آن سمت می‌داند. قرارگرفتن ژنوتیپ‌ها در ۴ گروه و نیز تفاوت گروه‌ها از نظر اکثر صفات، بیانگر آن است که برای رسیدن به حداکثر تنوع باید ژنوتیپ‌هایی از گروه‌های یک و چهار به عنوان والدین در برنامه‌های تلاقی در نظر گرفت. هم‌چنین برای سازماندهی و مدیریت این ژنوتیپ‌ها می‌توان برای هر صفت، این مجموعه از ژنوتیپ‌ها

منابع مورد استفاده

۱. ارزانی، ا. ۱۳۷۸. اصلاح گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
۲. اله قلی پور، م. ، ق. نعمت زاده و م. فتوکیان. ۱۳۷۷. تجزیه علیت صفات مهم زراعی روی عملکرد دانه در برنج. مجله دانشور، دانشگاه شاهد، تهران.
۳. بابائیان جلودار، ن، ق. نعمت زاده، م. کربلایی و ع. تائب. ۱۳۷۷. بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی برنج‌های بومی مازندران و مطالعه روابط بین صفت زودرسی و برخی صفات مهم زراعی دیگر. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، ۱۳-۹ شهریور ۱۳۷۷، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.
۴. رحیمیان ، ح. و م. بنایان. ۱۳۷۵ . مبانی فیزیولوژیکی اصلاح نباتات (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۵. قنادها، م. ، س. صادقی و م. صالحی. ۱۳۷۷. بررسی تنوع ژنتیکی برنج‌های بومی گیلان و تجزیه علیت عملکرد با اجزای آن. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، ۱۳-۹ شهریور ۱۳۷۷، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.
۶. مظاہری، د. و. آقا علیخانی. ۱۳۷۷. بوم‌شناسی گیاهان گرم‌سیری (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
۷. نوریزدان، ح . ۱۳۷۶. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و توده‌های بومی برنج در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۸. یزدی صمدی، ب.، ع. رضایی و م. ولی زاده . ۱۳۷۶. طرح‌های آماری در پژوهش‌های کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران.
9. Chaubey, P. K. and A. K. Richharia.1993. Genetic variability correlations and path-coefficients in indica rices. Indian J. Genet. 53 (4) 356-360.
10. De, R. N. , J. N. Reddy, A. V. Rao and K. K. Mohaniy. 1992. Genetic divergence in early rice under two situations,Indian J. Genet. 52(3) 225-229.
11. Jackson ,M. T. 1995.Protecting the heritage of rice biodiversity. Geojournal 53.3 : 267-274.
12. Johnson, D. E. 1998.Applied Multivariate Methods for Data Analysis. Duxbury press,New York, U.S.A.
13. Johnson ,R. A. and D. W. Wichern.1996.Applied multivariate statistical analysis. Sterling Book House, New Delhi.
14. Khush, G. S. 1995. Biotechnology approaches to rice improvement, proceedings of an international symposium on the use of induced mutations and molecular techniques for crop improvement. pp.455-475.

15. kumari, R. U. and P. Fangasamy 1997. Studies on genetic diversity in international early rice geneotypes. Ann. Agric. Res. 18 (1) 29-33.
16. IRRI.1996. Standard evaluation system for rice. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.
17. Sharma, B. D., D. K. Hore.1993. Multivariate analysis of divergence in upland rice (*Oryza sativa*). Indian J. Agric. Sci. 63 (8) 551 – 517.
18. Singh, A. K., S. B. Singh and S. M. Singh. 1996. Genetic divergence in scented and fine genotypes of rice (*Oryza sativa* L.). Ann. Agric. Res. 17 (2) 163-166.
19. Sinha, P. K., V. S. Chauhan, K. Prasad and J. S. Chauhan. 1991. Genetic divergence in indigenous upland rice varieties. Indian J. Genet. 51:47-50.
20. Suh, H. S., Y. I. Sato and H. Marishima. 1997. Genetic characterization of weedy rice (*Oryza sativa* L.) based on morpho-physiology, isozymes and RAPD markers. Theor. Appl. Genet. 94 (314)316-321.