

اشیاع نقشه پیوستگی ریزماهواره‌ای گندم نان در جمعیت حاصل از تلاقی AFLP Fukuho-Komugi × Oligo-Culm با استفاده از نشانگرها

^۳ مهدی رحیم ملک^۱، بدر الدین ابراهیم سید طباطبایی^۲ و سید ابوالقاسم محمدی^۴

(تاریخ دریافت: ۱۶/۱۲/۸۵؛ تاریخ پذیرش: ۲۶/۹/۸۶)

حکایہ

نقشه‌های ژنتیکی با پوشش بالای ژنوم نقش بسزایی در تحقیقات پایه و کاربردی ژنتیک ایفا می‌کنند. در دهه‌های اخیر با پیدا شدن نشانگرهای DNA تحول عظیمی در تهیه نقشه‌های ژنتیکی در گیاهان مختلف به خصوص گندم به وجود آمده است. در این تحقیق، از نشانگر AFLP برای اشباع نقشه ژنتیکی ۱۰۷ افراد هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی دو والد به نام‌های Fukuho-Komugi × Oligo-Culm دریافت شده از مرکز تحقیقات بین‌المللی کشاورزی ژاپن استفاده گردید. از چهارچوب نقشه ژنتیکی این جمعیت به عنوان نقشه پایه در تجزیه و تحلیل‌های بعدی استفاده شد. تجزیه AFLP با استفاده از آنزیم‌های برشی *MseI/PstI* انجام گرفت. متوسط درصد چند شکلی نشانگر AFLP ۰/۱۶ بود. تجزیه داده‌ها توسط نرم افزار Mapmaker/EXP Ver ۳/۳ با معیار حداقل فاصله ۵۰ سانتی مورگان و حداقل LOD برابر ۳ و رسم نقشه گروه‌های پیوستگی توسط نرم افزار Drawmap Ver1.1 انجام گرفت. ۱۱۵ نشانگر AFLP به ۱۰ گروه منتب شدند و تعدادی نیز به صورت غیرپیوسته باقی ماندند. تجزیه تکمیلی داده‌ها به همراه نشانگرهای ریزماهواره، موقعیت کروموزومی نشانگرها را تعیین کرد. در نهایت ۷۱/۱٪ نشانگرها به ژنوم A، ۵/۱۶٪ به ژنوم B و تنها ۳٪ به ژنوم D تخصیص یافتند. نشانگرهای AFLP مورد استفاده در این تحقیق توانستند در مجموع ۱۱ فاصله خالی را در هفت کروموزوم (۲A, ۳A, ۷A, ۲B, ۳B, ۵B, ۷B) پر نمایند. پوشش کم ژنوم D توسط نشانگرها به دلیل سطح کم چند شکلی در این ژنوم در جمعیت‌های مختلف و حالت حفظ شده آن در جمعیت‌های گوناگون می‌باشد. در بین کروموزوم‌ها، بیشترین تعداد نشانگر (۶۰) به کروموزوم VB تخصیص داده شد. توزیع نشانگرها روی این کروموزوم غیریکنواخت بود. توزیع غیریکنواخت نشانگر روی این کروموزوم به تجمع نشانگرهای AFLP در نواحی هتروکروماتین به خصوص اطراف سانترومر مربوط می‌شود.

AFLP و اژدهای کلیدی: گندم، جمعیت‌ها پلوئید مضاعف، نقشه بیوستگی،

مقدمة

پروتئین‌های سخت آندوسپرم است که باعث افزایش خاصیت

چسبندگی می‌شود. گندم نان با نام علمی *Triticum aestivum* از خانواده گرامینه و دارای ۴۲ کروموزوم ($2n=6x=42$) و

گندم اولین غله و مهم‌ترین گیاه زراعی دنیاست و خاصیت نانوایی آن به لحاظ بیشگی، گلوتن بخشی، از

۱. دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 ۲. دانشیار بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 ۳. دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

* مسئلهٔ مکاتبات، سمت الکترونیک: Savedt@cc.iut.ac.ir

* مسئول مکاتبات، بیت الکتر و نیکو : Sayedt@cc.iut.ac.ir

سه ژنوم متفاوت A، B و D دارد هرچه تعداد نشانگرهای ریزماهواره در نقشه ژنتیکی گندم افزایش یابند چهارچوب نقشه کامل تر و اهداف بعدي که شامل اشباع کردن نقشه، و مکان یابی ژن ها می باشد راحت تر انجام می گیرد (۸). پس از تهیه چهار چوب نقشه لازم است که با استفاده از نشانگرهای چندشکل نقشه ژنتیکی را اشباع کرد. یکی از نشانگرهای متداول و کارا در این زمینه نشانگرهای AFLP می باشند. این نشانگر مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد که توسط ووس و همکاران (۲۳) در سال ۱۹۹۵ ارائه گردید. این تکنیک براساس تکثیر دستجات خاصی از قطعات برش یافته ژنومی می باشد. در این نشانگر در مرحله اول DNA با استفاده از آنزیم های محدودگر، برش و سازگارهای (Adapters) دو رشته ای به انتهای قطعات DNA متصل می شوند تا جایگاه اتصال برای آغازگرها در مرحله تکثیر به وجود آید (۲۳).

تحقیقات متعددی در جهت اشباع نقشه ژنتیکی گندم در جمعیت های گوناگون انجام شده است. کادلن و همکاران (۳) به تهیه نقشه بین واریته ای در گندم نان و مقایسه آن با نقشه ژنتیکی گندم حاصل از تلاقی های مختلف گندم پرداختند. آنها ۱۰۶ لاین هاپلوئید مضاعف مضاعف حاصل از F_1 تلاقی مونوزومی های گندم چینی بهاره و "Courtot" را، مورد استفاده قرار دادند. نقشه حاصل ۱۸ گروه از ۲۱ گروه پیوستگی را پوشش داد. در مورد ژنوم های A و B توزیع نشانگرها تقریباً یکسان بود ولی کمترین پوشش متعلق به ژنوم D بود. برایان و همکاران (۲) تعدادی از ریز ماهواره های گندم را جداسازی کردند. در این تحقیق نیز کمترین تعداد نشانگرهای مکان یابی شده متعلق به ژنوم D گندم بود. نقشه ژنتیکی گندم براساس نشانگر AFLP توسط گرج و همکاران (۷) با استفاده از جمعیت هاپلوئید مضاعف ۹۳ فردی حاصل از تلاقی ارقام گندم Garnet و Garnet Saunders تهیه شد. رقم Garnet مقاومت به باد زدگی بالا و رقم Saunders مقاومت به بادزدگی بسیار کم داشتند. نقشه حاصل بر اساس ۶۲۰ نشانگر AFLP حاصل از ۶۰ ترکیب آغازگرهای *PstI/MseI* بود. در ضمن ۴۲ نشانگر ریزماهواره نیز در

هگزاپلوئید می باشد و دارای سه ژنوم A، B و D است (۱). پیشرفت های اخیر امکان یافتن ژن های خاص را روی کروموزوم های موجودات مختلف فراهم ساخته است. نقشه های ژنتیکی با پوشش بالای ژنوم نقش بسزایی در تحقیقات پایه و کاربردی ژنتیک ایفا می کنند. از کاربردهای نقشه های ژنتیکی می توان به مکان یابی ژن های موردنظر، تسهیل در اصلاح گیاهان به کمک نشانگرها، تهیه نقشه های براساس کلون اشاره کرد. نقشه پیوستگی موقعیت نسبی نشانگرهای ژنتیکی خاص را در طول کروموزوم ها نشان می دهد. اصول ایجاد نقشه های پیوستگی براساس وقوع نوترکیبی است که در تقسیم میوز به وقوع می پیونددند. انواع مختلفی از جمعیت های در حال تفرق برای تهیه نقشه ژنتیکی استفاده می شوند. تفاوت این جمعیت ها در میزان نوترکیبی، تعداد چرخه های میوزی و تثیت نو ترکیبی می باشد. یکی از انواع جمعیت های در حال تفرق جمعیت هاپلوئید مضاعف است. مهم ترین مزیت جمعیت های هاپلوئید مضاعف خلوص بالای آنهاست که امکان آزمایش های تکرار دار را می دهد و لذا در برنامه های مکان یابی امکان بررسی اثر متقابل محیط و مکان های ژنی کنترل کننده صفت کمی وجود دارد (۵، ۲۰ و ۲۴). در دهه اخیر با پیدایش نشانگرهای DNA تحول عظیمی در تهیه نقشه های ژنتیکی در گیاهان مختلف به خصوص گندم به وجود آمده است.

یکی از اهداف مهم در تهیه نقشه پیوستگی تهیه نقشه ژنتیکی اسکتی یا چهارچوبی است که اغلب بر اساس استفاده از نشانگرها ریزماهواره استوار است. فواصل بین نشانگرهای ریزماهواره توسط سایر نشانگرهای تصادفی ولی با چند شکلی زیاد همانند نشانگرهای AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) و ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) پر می شوند (۱۲). نقشه های ریز ماهواره ای گندم در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ توسط رودر و همکاران تهیه شد (۱۹ و ۲۰). در سال ۲۰۰۲، گوپتا و همکاران (۸) ۶۶ نشانگر ریز ماهواره جدید به نقشه ژنتیکی گندم اضافه کردند. با توجه به این که گندم ۲۱ گروه پیوستگی از

گندم و برخی صفات مورفولوژیکی از جمله طول خوش، ارتفاع بوته و ...) در دو دامنه مخالف یکدیگر قرار دارند و با توجه به جمعیت هاپلوبیید مضاعف حاصله که جمعیت خالص (هموزیگوتی) می‌باشد، امکان مطالعات آتی چون مکان‌یابی ژن‌های کنترل کننده صفات کمی و مکان‌یابی ژنهایی که در مناطق کم نشانگر یا بی نشانگر واقع هستند، پس از اشباع نقشه ژنتیکی تسهیل خواهد گردید.

مواد و روش‌ها

جمعیت مورد استفاده در تحقیق حاضر ۱۰۷ لاین هاپلوبیید مضاعف حاصل از تلاقی دو والد گندم *Triticum aestivum* به نام‌های Fukuho-Komugi و Oligo-Culm ایجاد شد. این ابتدا از مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی ژاپن دریافت شد. استخراج DNA ژنومی به روش دلاپورتا^(۶) انجام شد. کیفیت و کیفیت نمونه‌های AFLP با روش الکتروفورز ژل آگارز تعیین شد و واکنش DNA بر اساس روش ووس و همکاران^(۲۳) صورت گرفت.

برش DNA با استفاده از دو آنزیم برشی *PstI* و *MseI* تهیه شده از شرکت Roche آلمان انجام گرفت. سپس اتصال سازگارها به انتهای قطعات برش یافته با استفاده از آنزیم T4 لیگاز انجام شد. واکنش زنجیره‌ای پلی مراز در دستگاه ترموسایکلر اپندوروف Mastercycler gradient با ۳۰ چرخه شامل، ۹۴ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه، ۵۶ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه و ۷۲ درجه سانتی‌گراد یک دقیقه با استفاده از آغازگرهای با یک نوکلئوتید انتخابی انجام گرفت. در مرحله دوم تکثیر، محصولات حاصل از مرحله تکثیر پیش انتخابی به نسبت ۱:۵ رقیق شده و در واکنش تکثیر انتخابی به همراه آغازگرهای با سه نوکلئوتید انتخابی استفاده گردید. چرخه‌های حرارتی شامل دو دقیقه در دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد برای واسرشته کردن اولیه و پس از آن ۳۵ چرخه با دمای ۹۴ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه، ۶۵ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه و ۷۲ درجه سانتی‌گراد یک دقیقه که در ۱۲ چرخه اولیه، دمای اتصال آغازگر به میزان ۰/۷ درجه سانتی‌گراد در هر چرخه کاهش یافت و در ۲۳ چرخه باقی مانده در دمای ۵۶

این نقشه مورد استفاده قرار گرفت. Messmer و همکاران^(۱۵) نشانگرهای RFLP را در جمعیت حاصل از تلاقی Swiss winter Spelt و Frono (*Triticum aestivum*) wheat Oberculmer (*Triticum spelta*) استفاده نمودند. آنها ۱۷۶ نشانگر RFLP و ۹ نشانگر ریزماهواره روی ۲۰۴ فرد از جمعیت F₅ را مورد ارزیابی قرار دادند. حدود ۳۵ درصد از این مکان‌ها انحراف از تفرق ۱:۱ نشان دادند. پتگ و همکاران^(۱۶) جهت تهیه نقشه اشباع شده در گندم امر AFLP (Triticum dicoccoides)، از نشانگرهای مولکولی RAPD و SSR استفاده کردند. در این تحقیق، ۵۴۳ نشانگر مورد استفاده طول نقشه‌ای معادل ۳۰۰۰ سانتی مورگان را پوشش داد و در اکثر ۱۴ کروموزوم تجمع نشانگرها مشاهده شد. تمایز ژنتیکی بین *T. durum* و *T. dicoccoides* با استفاده از نشانگرهای AFLP به ژنوم B نسبت داده شد. نشانگرها بیکاری که انحراف از تفرق نشان دادند، اغلب روی کروموزوم‌های ۴A، ۴B و ۵B قرار داشتند. چالمرز و همکاران^(۴) سه نقشه پیوستگی را در گندم نان با استفاده از نشانگرهای AFLP و RFLP تهیه نمودند.

در گزارش آنها ۱۸۰ لاین هاپلوبیید مضاعف حاصل از سه تلاقی Tasman × Carnbrook × Halberd، CD87 × Katepwa و Sunco × Tasman مورد استفاده قرار گرفت. در سه تلاقی مذکور به ترتیب ۵۰۵ نشانگر، ۹۰۲ نشانگر و ۳۵۵ نشانگر در این جمعیت‌ها مکان‌یابی شدند و حدود ۱۰-۲۰ درصد نشانگرها به صورت ناپیوسته باقی ماندند.

باتوجه به مشکلات ژنومی گندم (چند شکلی کم، پوشش ژنومی کم ژنوم D و پوشش غیر یکنواخت کروموزوم‌ها توسط نشانگرها) وجود ۲۱ گروه لینکائی در گندم، اشباع کردن نقشه ژنتیکی آن امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف اصلی این تحقیق اشباع نقشه ژنتیکی ریزماهواره‌ای گندم با استفاده از نشانگر AFLP و پر کردن فضاهای خالی نقشه ژنتیکی قبلی با استفاده از این نشانگر می‌باشد. والدین مورد استفاده در این تحقیق از لحاظ صفات مختلف (از قبیل مقاومت به زنگ‌های

جدول ۱. توالی سازگارها و آغازگرهای *MseI* و *PstI* مورد استفاده در این تحقیق۱- توالی سازگارهای *MseI* و *PstI**PstI* adapter: 5'- GACTCGCTAGGTGCA- 3'

5'- CCTACGCAGTCTACGAG - 3'

MseI adapter: 5'- GACGATGAG TCC TGAG - 3'

5'- TACTCAGACTCAT - 3'

۲- توالی آغازگرهای *MseI* و *PstI* با یک نوکلئوتید انتخابی*PstI*: 5'-GAC TGC GTA GGT GCAG - 3'*MseI*: 5'- GAT GAG TCC TGA GTAA- 3'۳- توالی‌های سه نوکلئوتیدی انتخابی *MseI* و *PstI* که این سه نوکلئوتید در انتهای ۱۶ آغازگر می‌گیرند.

P1=AAG	M17=CAA	M28=CGT
P2=ACC	M18=CAC	M29=CTA
P3=ACG	M19=CAG	M31=CTG
P4=AGC	M21=CCA	
P5=AAC	M22=CCC	
P6=AGA	M24=CCT	

شد(۱۱و۱۳). ترسیم نمای کروموزومی گروههای پیوستگی توسط نرم افزار Drawmap Ver1.1 صورت پذیرفت (۲۲).

درجه سانتی‌گراد ثابت شد و نهایتاً به مدت دو دقیقه در دمای ۷۲°C قرار گرفت. توالی و ترکیب سازگارها و آغازگرهای مورد استفاده در این تحقیق در (جدول ۱) آمده است.


نتایج و بحث

در این تحقیق از ۱۳ ترکیب آغازگری، در مجموع تعداد ۶۸۴ نوار به دست آمد که از این تعداد ۱۱۵ نوار چندشکل بودند. اکثر نوارها بین محدوده ۵۰۰-۵ جفت باز قرار داشتند(شکل ۱). بیشترین درصد چندشکلی متعلق به ترکیب آغازگری P-AGC/M-CGT (۳۲/۵) و کمترین آن به آغازگری P-AAC/M-CCC (۷/۵) تعلق داشت. متوسط درصد چندشکلی در نشانگرهای مورد استفاده ۱۶/۶ درصد بود. در میان آغازگرهای انتخاب شده، ترکیب آغازگری P-AAC/M- CCC بیشترین تعداد نوار تک شکل (۷۳ نوار) را در مقایسه با سایر آغازگرها نشان داد (جدول ۲).

تجزیه مربع کای نشان داد که ۲۱ نشانگر از ۱۱۵ نشانگر از نسبت‌های مندلی ۱:۱ در جمعیت دابل هاپلویید انحراف نشان دادند ($P<0.01$). اکثر ۱۸/۲٪ نشانگرهایی که انحراف نشان دادند به سمت والد Fukuho-Komugi اریب بودند. چنین انحرافی در جمعیت‌های هاپلویید مضعی در دامنه‌های متفاوت در

محصولات تکثیری با استفاده از ژل پلی اکریل آمید شش درصد از نوع و اسرشت و حاوی هفت مولار اوره تنکیک گردید. قبل از بارگذاری نمونه‌ها، الکتروفورز مقدماتی به مدت ۳۰ دقیقه در شرایط ۱۰۰ وات ثابت و دمای ۵۵-۵۰°C صورت گرفت. الکتروفورز محصولات تکثیری نیز در همان شرایط و به مدت دو ساعت انجام شد. پس از الکتروفورز، رنگ آمیزی ژل به روش نیترات نقره انجام گرفت و از الگوی نواری به دست آمده عکس برداری شد. الکتروفورز با دستگاه توالی یاب (Sequencing gel) Biometra مدل S2 انجام گرفت.

امتیازدهی داده‌ها به صورت حروف A و H انجام شد و انحراف داده‌ها از نسبت‌های ۱:۱ با استفاده از تست مربع کای صورت پذیرفت. تجزیه داده‌ها توسط نرم افزار 3.3 Mapmaker/EXP Ver با معیار حداقل فاصله ۵۰ سانتی مورگان (LOD ۳) برابر ۲ انجام گرفت و از تابع کوسامبی (Kruskal-Wallis) برای تبدیل فواصل نووترکیبی به سانتی مورگان استفاده




شکل ۱. الگوی نواری آغازگر P-ACG & M-CGT به منظور بررسی نوارهای چندشکل بین والدین و ۴۳ فرد مضاعف هاپلوید

مقدماتی و تشکیل گروههای پیوستگی اولیه، لازم بود که موقعیت مکانی نشانگرها روی کروموزومها مشخص گردد. بدین منظور داده‌های AFLP همراه با داده‌های نشانگرهای ریزماهواره ارائه شده توسط سوناجا و همکاران (نتایج منتشر نشده است) تجزیه شد. بر این اساس از ۱۱۵ نشانگر AFLP، ۸۱ نشانگر

تحقیقات قبلی نیز گزارش شده است (۹). پس از حذف ۲۱ نشانگر مذکور، تجزیه داده‌ها با استفاده از نرم افزار Mapmaker/EXP Ver 3.3، انجام گرفت و نشانگرهای AFLP را در ۱۰ گروه طبقه‌بندی کرد؛ که برخی از نشانگرها نیز به صورت غیرپیوسته باقی ماندند (شکل ۲). پس از تجزیه


جدول ۲. تعداد نوارهای چندشکل، تک شکل و درصد چندشکل مشاهده شده در جمعیت دابل هاپلویید حاصل از تلاقی Oligo-Culm و Fukuhō-Komugi با استفاده از آغازگرهای مختلف

درصد چندشکل	تعداد کل نوار	تعداد کل نوار چندشکل	تعداد نوار تک شکل	تعداد نوار چندشکل	نام آغازگر
۱۳	۶۹	۹	۶۰	۹	P1/M17
۸/۸	۳۴	۳	۲۱	۳۱	P1/M26
۱۱/۳	۴۴	۵	۳۹	۴۹	P1/M18
۱۰	۴۰	۶	۳۴	۴۴	P2/M19
۲۹	۴۸	۱۴	۳۴	۳۴	P2/M31
۱۱/۱	۵۴	۶	۴۸	۴۸	P2/M29
۲۷/۱	۵۹	۱۶	۴۳	۴۳	P3/M29
۱۵/۷	۷۰	۱۱	۵۹	۵۹	P3/M28
۱۷	۴۷	۸	۳۹	۳۹	P3/M24
۲۰	۷۵	۱۵	۵۵	۵۵	P4/M31
۳۲/۵	۴۰	۱۳	۲۷	۲۷	P4/M28
۷/۵	۷۹	۶	۷۳	۷۳	P5/M22
۹	۳۳	۳	۳۰	۳۰	P6/M21
-	۶۸۴	۱۱۰	۵۶۹	۵۶۹	مجموع
۱۶/۶	۵۲/۶	۸/۸	۴۳/۷	۴۳/۷	میانگین



شکل ۲. نقشه پیوستگی نشانگرهای AFLP با معیار حداقل فاصله ۵۰ سانتی مترگان و حداقل LOD برابر ۳ و تابع نقشه کوسامی

نتایج نشان می‌دهند که در صد چند شکلی در گندم نان پایین می‌باشد. در نتیجه لازم است که نشانگرهای با سطح چند شکلی بالا به منظور تهیه نقشه ژنتیکی گندم استفاده شوند. براساس گزارشات موجود میزان چند شکلی در غلات متفاوت است. این میزان در برنج ۲۶/۶٪، ذرت ۴۸٪، جو ۱۱/۳٪، گندم ماکارونی ۲۳/۸٪ و گندم نان ۱۲/۸٪ گزارش شده است (۱۲). از طرفی میزان چند شکلی نشانگرهای AFLP نیز در گندم متفاوت ذکر شده است و در تحقیقات انجام شده بین ۱ تا ۱۴ و متوسط ۷/۷ نوار چند شکل متغیر بوده است (۴). داده‌های این تحقیق نیز با گزارش‌های مذکور مطابقت دارد. یکی از مواردی که در تحقیق حاضر مشاهده می‌شود عدم توزیع یکنواخت نشانگرها در سه ژنوم بود. توزیع و فراوانی نشانگرهای AFLP در طول ژنوم یکنواخت نیست و همانند سایر غلات انتخاب ترکیب آغازگرها به طور مستقیم روی توزیع مکانی نشانگرهای AFLP تأثیر می‌گذارد. دلیل توزیع غیریکنواخت این نشانگر به مکانیسم‌های ایجاد چندشکلی در این نشانگر، نسبت داده می‌شود. واقعی مانند جهش، حذف و اضافه شدن قطعات در ایجاد چند شکلی در این نشانگر دخیل می‌باشند (۱۳). اکثر این وقایع به طور تصادفی در طول ژنوم به وقوع می‌پیوندند و بنابراین می‌توان انتظار داشت که نشانگرهای AFLP نیز به صورت تصادفی در طول ژنوم قرار گرفته باشند. عموماً نشانگرهای AFLP که با ترکیب‌های مختلف آنزیم‌های برشی حاصل شده‌اند، توزیع مناسب‌تری در طول ژنوم داشته‌اند. تجمع نشانگرها به خصوص AFLP در نواحی سانترومی و AFLP-۳۶ شده است (۱۲ و ۲۱). تجمع نشانگرهای AFLP در نواحی سانترومی شاید به دلیل کاهش یا ممانعت از RFLP نوتروکی بی در این مناطق باشد (۱۲) و این عقیده در مورد سایر نقشه‌های ژنتیکی منتشر شده در سایر غلات نیز صادق است. لانگرلیگ و همکاران (۱۲) اشاره نمودند که نشانگرهای AFLP در اکثر مواقع خارج از مناطقی قرار می‌گیرند که توسط نشانگرهای RFLP به طور متراکم اشغال شده‌اند. این عامل موجب افزایش طول نقشه می‌شود که در نهایت باعث پدیده



شکل ۳. موقعیت نشانگرهای AFLP بین سایر نشانگرهای نقشه ژنتیکی قبلی در کروموزوم ۵B

(۱/۷) به ژنوم A ۱۹ نشانگر (۱۶/۵٪) به ژنوم B (۷/۱٪) و نشانگر (۲/۶٪) به ژنوم D متنسب شدند. در این میان ۴۹ نشانگر AFLP در مکان‌های مناسب نقشه قرار گرفتند و ۱۱ نشانگر در نواحی بسیار مناسب (با تراکم کم نشانگرهای قبلی) واقع شدند. تجزیه نهایی داده‌ها نشان داد که تعداد زیادی از نشانگرهای AFLP روی کروموزوم ۷A واقع شدند و تعدادی نیز به هیچ گروه پیوستگی متنسب نشدند. تعدادی از گروه‌های ایجاد شده در تجزیه اولیه داده‌های AFLP، در تجزیه تکمیلی داده‌ها با به یکدیگر پیوسته و فضاهای خالی یک کروموزوم را پر کردند. از آن جمله می‌توان به نشانگرهای AFLP-۳۵ و AFLP-۳۶ از گروه شش نشانگرهای AFLP-۲۲ و AFLP-۹۷ از گروه چهار اشاره کرد که هر چهار نشانگر به خوبی توانستند فواصل خالی سایر نشانگرها را در نقشه قبلی در کروموزوم ۵B پر کنند (شکل ۳). نشانگرهای AFLP مورد استفاده در این تحقیق توانستند در مجموع ۱۱ فاصله خالی را در هفت کروموزوم (۵B, ۳B, ۲B, ۷A, ۳A, ۲A, ۷B) پر نمایند.

تجمع نشانگرهای AFLP در نواحی سانترومی نشان دهنده کاهش سطح نوترکیبی میوزی در آن مناطق است. بنابراین تراکم بالای نشانگرها در نواحی نزدیک سانترومی تواند مربوط به کاهش نوترکیبی باشد. در ضمن نواحی هتروکروماتین کروموزوم میزان نوترکیبی کمتری در مقایسه با نواحی یوکروماتین دارند که احتمالاً مربوط به حالت متراکم تر هتروکروماتین در مرحله کراسینگ آور میوز میباشد(۱۴). این نواحی از ژنوم معمولاً جزء نواحی خاموش و کم فعالیت ژنوم محسوب میشوند و معمولاً دارای ژن های فعال نیستند. در مقابل، برخی از نواحی کروموزوم که نقاط داغ نوترکیبی هستند؛ دارای توزیع متنوع تری از نشانگرها میباشند(۱۴). تهیه نقشه های ژنتیکی با تراکم بالای نشانگر و توزیع مناسب در مناطق با سطح نوترکیبی بالا به راحتی امکان پذیر است ولی در مناطقی که نوترکیبی کاهش مییابد، استفاده از جمعیت بزرگ تر برای افزایش دقت نقشه ژنتیکی ضروری میباشد. (۲۱).

بنابراین، ضروری به نظر میرسد که نواحی با تراکم کم نشانگر توسط نشانگرهای چند شکل تا حد امکان پوشش داده شود تا مکان یابی ژن ها با سهولت و دقت بیشتری صورت پذیرد. با توجه به این که گندم گیاهی خود گشن است و میزان دگرگشتنی پایینی دارد و نظر به این که جمعیت مورد استفاده در این تحقیق جمعیت هاپلوئید مضاعف با هموزیگوستی بالا میباشد، از این رو، امکان مطالعات تکرار دار و بررسی اثر متقابل محیط و مکان های کنترل کننده صفات کمی با این جمعیت امکان پذیر میباشد. پس به منظور تعیین موقعیت ژن های صفات کمی و سایر ژن های مفید اشباع هرچه بیشتر این نقشه لازم به نظر میرسد.

سپاسگزاری

امکانات مالی و تجهیزات این تحقیق بر اساس طرح بین دانشگاهی صنعتی اصفهان فراهم گردیده است و جمعیت مورد استفاده در این تحقیق از مرکز تحقیقات بین المللی ژاپن تهیه شده است که بدین وسیله مراتب قدردانی اعلام میگردد.

طويل شدن نقشه ها با فواصل غيرمتراکم میگردد که نیاز به پرکردن و اشباع این نقشه ها را پیش از پیش مطرح مینماید. نکته قابل توجه دیگر در تهیه نقشه ژنتیکی گدم آن است که سه ژنوم گندم از نظر پوشش نشانگرها متفاوت میباشند و گزارشات متعددی در این زمینه ارائه شده است. توزیع نشانگرهای AFLP در دو ژنوم A و B تفاوتی نشان نداد ولی تعداد نشانگرهای متنسب شده به ژنوم D در مقایسه با ژنوم A و B بسیار کم بود، به طوری که در نقشه ریزماهواره ای گندم نیز پوشش بسیار کم ژنوم D مشاهده میشود و دلیل آن سطح پایین چند شکلی ژنوم D در جمعیت های مختلف میتواند باشد(۱۵). پستوا و همکاران (۱۶) در تحقیقات خود متذکر شدند که اگر نشانگرهای تصادفی در نقشه ژنتیکی گندم استفاده شوند، ژنوم D کمترین پوشش را خواهد داشت و استفاده از نشانگرهای اختصاصی برای پوشش دادن ژنوم D بهترین راه حل میباشد. براساس گزارش های موجود، انحرافات زیاد دیگری نیز در فراوانی نشانگرها وجود دارد، که این انحرافات میین تفاوت در تنوع کروموزومی بین والدین است (Chalmers) و همکاران (۱۷) تجمع تعداد زیادی از نشانگرها را در کروموزوم ۲B (۴۴ نشانگر) و ۷A (۲۷ نشانگر) در جمعیت حاصل از تلاقی Tasman×Sunoco گزارش کردند. آنها تجمع این نشانگرها را به یک جایه جایی بزرگ از T. *timopheevi* روی کروموزوم (۲B) نسبت دادند.

چالمرز و همکاران (۱۸) بیان کردند که توزیع نشانگرها حتی در طول کروموزم نیز به طور یکنواخت نیست. در برخی از مناطق کروموزومی مثل نواحی انتهایی تجمع زیاد نشانگرها مشاهده میشود و در سه تلاقی مورد استفاده سه ناحیه با تجمع نشانگرهای متعلق به کروموزوم ۷A بودند، که این نتیجه با تجمع نشانگرهای AFLP روی کروموزوم ۷A در تحقیق حاضر مشابه بود. آنها نشان دادند که در بین نشانگرهای AFLP، RFLP و SSR، دو نشانگر RFLP و SSR پراکنده‌گی یکنواخت تری در طول ژنوم داشتند، در حالی که تمایل نشانگرهای AFLP به نواحی تلومری بیشتر از RFLP بود.

منابع مورد استفاده

۱. یزدی صمدی، ب. و س. عبد میشانی. ۱۳۷۵. اصلاح نباتات زراعی. انتشارات دانشگاه تهران.
2. Bryan, G.J., A.J. Collins, O. Stephenson, J.B. Smith and M.D. Gale. 1997. Isolation and characterization of micro satellites from hexaploid bread wheat. *Theor. Appl. Genet.* 94: 557-563.
3. Cadalen, T., C. Boeuf, S. Bernard and M. Bernard. 1997. An Intervarietal molecular map in *Triticum aestivum* L. and comparison with a map From A Wide Cross. *Theor. Appl. Genet.* 94:367-377.
4. Chalmers, K. J., W. Canobell, J. Kretschmer, A. Karakousis, P. H. enschke, S.Pierns, Harker, M. Pallota, G. B. Cornish, M. R. Shariflou, L. R.ampling, A. McLauchlan, G. Daggard, P. J. Sharp, T. A. Holton, M. W. Sutherland, R. Apples and P. Landridge. 2001. Construction of three linkage maps in bread wheat, *Triticum aestivum*. *Aust. J. Agric. Res.* 52: 1089-1119.
5. Cowen, N. M. 1988. The use of replicated progenies in marker-based mapping of QTL. *Theor. Appl. Genet.* 75:857-862.
6. Dellaporta, S. L. and J. B. Wood. 1983. A Plant DNA minipreparation: Ver II. *Plant. Mol. Biol. Rep.* 4:19-21.
7. Greg, A. P. 1998. An AFLP based genome map of wheat (*Triticum aestivum*). Plant & Animal Genome VI Conference. San Diego, CA, January 18-22.
8. Gupta, P. K., H. S. Balyan, K. J. Edwards, P. Isaac, V. Korzun, M. S. Roder, F.Gautier, P. Joudrier, A. R. Schlatter, J. Dobcovsky, R. Delapena, M. Khairallah, G. Penner, M. J. Hayden, P. Sharp, B. Keller, R. C.Wang, J. P. Hardouin, P. Jack and P. leory. 2002. Genetic mapping of 66 new microsatellite (SSR) loci in bread wheat. *Theor. Appl. Genet.* 105:413-422.
9. Kammholz, s. J., A. W. Campbell, M. W. Sutherland, G. J. hollamby, P. J artin, R.F. Estwood, I. Barclay, R.E. Wilson, P. S. Brennan and J. A. Sheppard. 2001. Establishment and characterization of wheat genetic mapping populations. *Aust. J. Agric. Res* 52:1079-1088.
10. Kosambi, D. 1944. The estimation of map distances from recombination values. *Analys of Eugenics.* 12:172-175.
11. Lander, E. S., P. Green, J. Abrahamson, A. Barlow and M. Daley. 1987. MAPMAKER: an intractive computer package for constructing primary genetic linkage maps of experimental and natural populations. *Genomics* 1:174-181.
12. Langridge, P., E. S. Lagudah, T. A. Holton, P. J. Sharp and K. Chalmers. 2001. Trends in genetic and genome analysis of wheat:a review. *Aust. J. Agric. Res* 2:1043-1077.
13. Lincoln, S., M. Daly and E. Lander. 1992. Constructing genetic linkage maps with MAPMAKER\EXP. Whitehead Institute Technical Report.<http://www-genome.wi.mit.edu/ftp/distribution/software>.
14. Mather, K. 1938. Crossing over heterochromatin in X chromosome of *Drosophila melanogaster*. *Genetics* 24:413-435.
15. Messmer. M. M., M. Keller, S. Zanetti and B. Keller .1999. Genetic Linkage map of wheat × spelt cross. *Theor. Appl. Genet.* 98:1163-1170 .
16. Peng, J., T. Fahima, M. S. Roddr, Y. Ronin, L. Youchun, J. Cheng, A. B. Korol and E. Nevo. 2000. Molecular genetic maps in wild Emmer wheat, *Triticum dicoccoides*: genome –wide coverage, massive negative interference and putative quasi-linkage. *Genome* 10:1509-1531.
17. Pestova, E, M. W. Ganal and M. S. Rodder. 2000. Isolation and mapping of microsatellite markers specific for the D genome of bread wheat. *Genome* 43:689-697.
18. Roder MS, V. Korzun, K. Wendehake, J. Plaschke, MH. Tixier, P. Leroy and M.Ganal. 1998a. A microsatellite map of wheat. *Genetics* 149:2007-2023.
19. Roder, M. S., J. Plaschke, SU. Konig, A. Borner, ME. Sorrels, SD. Tanksley and MW. Ganal .1995. Abundance, variability and chromosomal location of microsatellites in wheat. *Mol. and Gen. Genet.* 246:327-333.
20. Suenaga, K. and K. Nakajima. 1993. Segregation of genetic markers among wheat double haploid lines derived from wheat × maize crosses. *Euphytica* 65:145-152.
21. Tanksley, S. D., M. W. Ganal, J. P. Prince, M. C. Vicente, M. W. Bonierbale, P. Broun, T. M. Fulton, J. Giovannoni, S. Grandillo, G. B. Martin, R. Messinguer, J. C. miller, L. Miller, A. H. Paterson, O. pineda, M. S. oder, R. A. Wing and N. D Young. 1992. High density molecular linkage maps of the tomato and potato genomes. *Genetics* 132:1141-1160.
22. Van Ooijen, J. W. 1994. Draw Map a computer program for drawing genetic linkage maps. *J. Hered.* 85:66.
23. Vos, P., R. Hogers, M. Bleeker, M. Reijans, D. L. Theovan, M. Hornes, A. Frijters, M. Kuiper and M. Zabeau .1995. AFLP: A new technique for DNA fingerprinting. *Nucleic Acid Res.* 23: 4407-4414.
24. Young, N.D. 2001. Constructing a plant genetic linkage map with DNA markers, PP 31-47. In: R. Phillipson and Z. Vasil(Eds.), DNA- Based Markers in Plants. Kluwer Academic Pub., The Netherland.