

تأثیر حرارت دهی مقدماتی و رقم سیب‌زمینی بر خصوصیات کیفی فرنج فرایز منجمد

شهرام دخانی^۱، سارا جعفریان^۱، غلامحسین کبیر^۱ و احمد مرتضوی‌بک^۲

چکیده

به منظور بررسی تأثیر فرایند حرارتی مقدماتی بر کیفیت فرنج فرایز یا خلال نیمه سرخ شده (سولانوم توپروزوم - ال)، چهار رقم سیب‌زمینی به نام‌های آگریا، مارفونا، آنولا و آنوزونیا از منطقه فریدن اصفهان خریداری و به سردخانه دانشکده کشاورزی با دمای ۵ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۹۰-۸۵ درصد منتقل گردیدند. در ابتدا آزمون‌های فیزیکوشیمیایی اندازه‌گیری وزن مخصوص و درصد ماده خشک به روش A.O.A.C و درصد قندهای احیا کننده به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) روی ارقام سیب‌زمینی انجام گرفت. نمونه برداری به صورت کاملاً تصادفی بود. خلال‌های سیب‌زمینی در ابعاد ۵×۵/۸×۵/۸ سانتی‌متر در آب با شرایط حرارتی مختلف ۷۰ درجه ۴- دقیقه، ۷۰ درجه -۱۰ دقیقه و ۹۵ درجه -۲ دقیقه تیمار شده و سپس به طور عمقی در روغن ۱۷۵ درجه سلسیوس به مدت ۲ دقیقه سرخ شدند. خصوصیات کیفی مورد بررسی در محصول نهایی عبارت بودند از: بافت، رنگ و درصد جذب روغن. نتایج تحقیق در طرح آماری کاملاً تصادفی با آزمون فاکتوریل و مقایسه میانگین چند دامنه‌ای دانکن تجزیه و تحلیل شدند ($p < 0/01$). نتایج نشان داد تیمار 70°C -۱۰ دقیقه شاخص‌های کیفی محصول را به طور محسوسی بهبود می‌بخشد. تیمار 95°C -۲ دقیقه از نظر فاکتورهای رنگ هائترلب، تفاوت معنی داری با تیمار 70°C -۱۰ دقیقه نداشت ولی بافت خلال‌ها افت قابل توجهی نشان داد. جذب روغن در تیمارهای غیر از 70°C -۱۰ دقیقه افزایش یافت. تیمار 70°C -۴ تغییر محسوسی در کیفیت محصول ایجاد نکرد. هم‌چنین ملاحظه گردید که در میان ارقام مورد بررسی در این تحقیق، ارقام آگریا و آنولا برای فرایند تولید فرنج فرایز مطلوب تر از دو رقم دیگر هستند.

واژه‌های کلیدی: رقم سیب‌زمینی، پارامترهای کیفی فرنج‌فرایز، آنزیم بری، حرارت مقدماتی

مقدمه

- بهبود رنگ محصول در نتیجه کاهش میزان قندهای احیا کننده.
- تیمار حرارت مقدماتی در صنعت فرآوری سیب‌زمینی که از آن به بلانچینگ یا آنزیم بری هم تعبیر می‌شود نتایج زیر را در پی دارد (۲۰):
- کاهش جذب روغن به دلیل ژلاتینه شدن نشاسته سطحی
- بهبود بافت محصولات

۱. به ترتیب استاد، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲. پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان

اصلی تشکیل رنگ در فرایند تولید چیپس و خلال، واکنش‌های مایلارد است که در نتیجه تیمار حرارت مقدماتی غلظت سطحی قندها کاهش یافته و محصولی با رنگ روشن تر و یکنواخت تر تولید می‌شود (۱۶).

زانگ و همکاران تأثیر بیوشیمیایی فرایند حرارتی را از جنبه غیر فعال کردن آنزیم‌های ایجاد کننده تغییرات نامطلوب در طعم و رنگ فرآورده‌های سیب‌زمینی بررسی کرده‌اند اما زمان طولانی فرایند حرارتی را توصیه نمی‌کنند زیرا معتقدند در صورت تداوم حرارت دهی رنگ محصولات به تیرگی می‌گراید (۲۰). کجبت زمان بیش از ۱۵ دقیقه را عاملی برای افزایش جذب روغن در محصول فرنیج فرایز معرفی می‌کند (۹). میزان ماده خشک ارقام سیب‌زمینی و وزن مخصوص آنها از پارامترهایی هستند که با یکدیگر رابطه مستقیم داشته و در کیفیت سیب‌زمینی و فرآورده‌های آن اثر بسزایی می‌گذارند (۱۹). در تحقیقی توسط دخانی مشاهده شد رقم پشندی با وزن مخصوص ۱/۱ دارای بیشترین ماده خشک ۲۵/۴٪ و رقم کوزیما با وزن مخصوص ۱/۰۸۶ دارای کمترین میزان ماده خشک ۲۳/۳٪ بوده است (۱). ربیعی در پژوهش دیگری اعلام می‌کند ارقام پاییزه آگریا و مارفونا دارای به ترتیب حد اکثر ۱/۰۷۵ - ۲۳/۴٪ و حد اقل ۱/۰۵۲ - ۱۸/۵٪ مقادیر وزن مخصوص و ماده خشک هستند. این محققین اعلام نمودند که با افزایش ماده خشک یا وزن مخصوص سیب‌زمینی میزان جذب روغن فرآورده‌هایی نظیر چیپس و فرنیج فرایز کمتر می‌گردد (۲).

با توجه به مشکلات نگه‌داری، حمل و نقل و نوسان فصلی قیمت سیب‌زمینی تازه، تولید فرآورده‌های آماده مصرف نظیر فرنیج فرایز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محصول و یکنواختی آن طی دوره تولید ضروری است به ویژه روش‌هایی که به واسطه آنها بتوان میزان مصرف روغن در فرایند را کاهش داد. در این پژوهش با هدف بهبود کیفیت فرنیج فرایز، اثر فرایند حرارتی مقدماتی و رقم سیب‌زمینی بر شاخص‌های کیفی محصول نظیر

اسمیت (۱۶) و اسپایس (۱۷) آثار تیمار حرارتی را بر بافت فرآورده‌های سیب‌زمینی مطالعه نموده و معتقدند دمای پایین باعث حفظ سفتی بافت شده، پوسته شدن را در مراحل بعدی کاهش می‌دهد. بارتلمی و هوف به ژلاتینه شدن نشاسته اشاره می‌کنند (۵). استنلی با تأیید این نظریه مکانیسم سفت شدن بافت خلال‌ها را در دامنه حرارت ۷۰-۵۵ درجه سلسیوس شرح داده و معتقد است یون‌های دو ظرفیتی کلسیم آزاد شده از نشاسته ژلاتینه با ترکیبات پکتینی وارد واکنش شده و تولید پکتات کلسیم می‌کنند (۱۸). در دمای بین ۶۰-۷۵ درجه سلسیوس به ویژه در دمای ۷۰ درجه تعداد بیشتری از گرانول‌های نشاسته ژلاتینه می‌شوند که در نتیجه کلسیم بیشتری آزاد شده و به هم پیوستگی درون سلولی افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند تحت تأثیر تشکیل پل‌های کلسیم - پکتین که مانع از حلالیت پکتین می‌شوند باشد (۹). در نمونه‌هایی که تنها با آب حاوی کلرید کلسیم آنزیم بری شده بودند کاهش حداکثر ۱۴٪ در جذب روغن مشاهده گردید. این بدان معنی است که کلسیم به تنهایی قادر به تثبیت ساختار بافت در برابر فشار ناشی از سرخ کردن می‌باشد. در حضور کلسیم بافت سفت‌تر می‌شود زیرا پکتات کلسیم استحکام لایه میانی دیواره را افزایش داده و بافت را نسبت به تخریب و فشارهای ناشی از سرخ کردن مقاوم می‌کند. گرازینا زمان طولانی فرایند را توصیه نمی‌کند زیرا معتقد است در صورت تداوم فرایند حرارتی رنگ محصول به تیرگی گراییده طعم و عطر مطلوب آن از بین می‌رود. او دمای ۷۳ درجه را پیشنهاد می‌کند (۸).

استنلی و بارتلمی با مطالعه فعالیت آنزیم پکتین متیل استراز اعلام کردند که فعالیت این آنزیم در محدوده ۷۰-۵۰ درجه رو به افزایش می‌گذارد ولی از ۷۵ درجه به بالا تضعیف می‌شود (۵ و ۱۸). اسپایس بیان می‌کند اگر خلال‌ها در ۹۵ درجه به مدت ۲ دقیقه بلانچ شوند روغن کمتری از خلال‌هایی که در ۸۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه بلانچ شده‌اند جذب خواهند نمود (۱۷). حرارت دهی مقدماتی به یکنواختی رنگ فرآورده‌های سیب‌زمینی کمک می‌کند (۱۸). به نظر بیشتر محققین واکنش

بافت، رنگ و میزان جذب روغن بررسی گردید.

مواد و روش‌ها

مواد

الف) نمونه‌های سیب‌زمینی

در آبان ۷۹ چهار رقم سیب‌زمینی پاییزه (آگریا، مارفونا، آنولا و آئوزونیا) از منطقه فریدن اصفهان انتخاب و از هر یک به میزان ۵۰ کیلو گرم خریداری گردید. سیب‌زمینی‌ها درگونی و به سردخانه بالای صفر دانشکده کشاورزی با دمای ۵- تا ۴- درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۹۰- تا ۸۵ درصد منتقل شدند.

ب) مواد شیمیایی

حلال n- هگزان، اسید کلریدریک، اسید استیک خالص، کلرفرم خالص، اتانل، تیوسولفات سدیم، سود، فنل فتالین، EDTA، نشاسته، آب مقطر دو بار تقطیر شده، کاغذ صافی واتمن شماره ۴۱.

کلیه مواد و محلول‌های شیمیایی فوق با مارک مرک و با خلوص بیش از ۹۸/۵٪ تهیه شدند.

روش‌ها

در ابتدای ورود غده‌ها به سردخانه آزمون‌های تعیین وزن مخصوص و ماده خشک به روش A.O.A.C انجام گرفتند (۴). میزان قندهای احیا کننده اصلی سیب‌زمینی که عمدتاً مونوساکاریدهای گلوکز، فروکتوز و دی ساکارید ساکارز هستند به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تعیین شدند (۶). نمونه برداری به صورت کاملاً تصادفی بود. در هر سری نمونه‌های ۹ تایی از ارقام برداشته شد. غدد در سه گروه سه تایی مرتب شده که هر گروه شامل یک غده بزرگ، یک غده کوچک و یک غده متوسط بود (۳). آزمون‌ها با دو تکرار برای هر گروه انجام شدند.

برای تعیین ماده خشک، نمونه‌ها کاملاً خرد و همگن شده، ۱۰ گرم آن تا رسیدن به وزن ثابت در دمای 105 ± 5 درجه

سلسیوس و زمان ۵- تا ۴- ساعت در آون با جریان هوا قرار داده شد که پس از خشک شدن کامل، میزان ماده خشک با توزین محاسبه گردید.

برای تعیین وزن مخصوص غده‌ها را درون یک تور سیمی قرار داده، تور را با سیمی نازک به شاهین ترازو متصل نموده و وزن آن قرائت گردید. سپس به همان صورت درون یک ظرف پر از آب فرو برده شد. وزن نمونه‌ها در آب خوانده شده و از رابطه زیر وزن مخصوص محاسبه گردید (۲):

$$\text{وزن مخصوص} = \frac{\text{وزن نمونه در هوا}}{(\text{وزن تور در آب} - \text{وزن تور در هوا}) - (\text{وزن نمونه و تور در آب} - \text{وزن نمونه و تور در هوا})}$$

در مرحله بعد اقدام به تولید فرنیج فرایز گردید. غدد سیب‌زمینی قبل از استفاده به مدت دو هفته در دمای ۲۰- تا ۱۸- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند (۱).

ابتدا مقداری از سیب‌زمینی‌های متوسط تا درشت هر رقم را انتخاب نموده و در پوستگیر سایشی، پوستگیری و شسته شده سپس در دستگاه خلال کن دستی به ابعاد $5 \times 0.8 \times 0.8$ سانتی‌متر خلال شدند. نمونه‌های ۲۰۰ گرمی از خلال‌های یک اندازه و سالم انتخاب شده که تحت شرایط حرارتی مختلف تیمار شدند: آب ۷۰ درجه سلسیوس -۱۰ دقیقه، آب ۷۰ درجه سلسیوس -۴ دقیقه، آب ۹۵ درجه سلسیوس -۲ دقیقه و نمونه شاهد یا بدون تیمار حرارتی. سپس خلال‌ها در آب سرد قرار گرفته و آبکشی شدند.

پس از آن خلال‌ها را به مدت ۱۰ دقیقه در آب سرد فرو برده و سپس آبکشی شدند. پس از حذف رطوبت خلال‌ها با جریان هوای گرم، در روغن ۱۷۵ درجه به مدت ۲ دقیقه در سرخ کن به طور عمقی سرخ شدند (۱۴ و ۱۵). روغن مصرفی مرکب از دو قسمت روغن مایع و یک قسمت روغن هیدروژنه بود (۲). سپس خلال‌ها را به مدت ۲۰ دقیقه در سینی‌های مشبک استیل ریخته که تا حد امکان چربی آنها گرفته شده و در ضمن محصول سرد شود.

خصوصیات کیفی مورد بررسی در خلال‌های سیب‌زمینی عبارت بودند از (۱۰):

جدول ۱. وزن مخصوص و درصد ماده خشک ارقام سیب‌زمینی (آگریا، مارفونا، آتولا و آتوزونیا) در زمان برداشت

رقم	وزن مخصوص	در صد ماده خشک
آتولا	۱/۰۹ ± ۰/۰۵	۲۴/۹۶ ± ۱
آگریا	۱/۰۸ ± ۰/۰۵	۲۳/۴۴ ± ۱/۰۵
آتوزونیا	۱/۰۷ ± ۰/۰۶۲	۲۰/۳۷ ± ۰/۹۵
مارفونا	۱/۰۶ ± ۱/۰۶۵	۱۹/۰۱ ± ۱/۳۵

جدول ۲. میزان قندهای احیاکننده عمده ارقام سیب‌زمینی مورد مطالعه در زمان برداشت با روش HPLC

رقم	ساکارز mg /100 gr (ماده خشک)	گلوکز mg /100 gr (ماده خشک)	فروکتوز mg /100 gr (ماده خشک)
آتولا	۰/۷۷	۰/۰۹	۰/۰۷
آتوزونیا	۰/۵۹	۰/۰۶	۰/۰۶
مارفونا	۰/۲۹	۰/۰۶	۰/۰۳
آگریا	۰/۳۰	۰/۰۳	۰/۰۳

کاملاً تصادفی و با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل گردیدند که در این راستا از آزمون فاکتوریل و آزمون دانکن برای مقایسه میانگین‌ها در سطح ۱٪ استفاده شد.

نتایج و بحث

در جدول ۱ نتایج حاصل از اندازه‌گیری ماده خشک و وزن مخصوص و درصد قندهای احیا کننده غده‌های سیب‌زمینی ارقام آگریا، مارفونا، آتولا و آتوزونیا ارائه گردیده است. ملاحظه می‌شود در میان ارقام مورد بررسی، رقم آتولا دارای بیشترین ماده خشک و وزن مخصوص می‌باشد. این مقادیر در رقم مارفونا به حداقل می‌رسد. همچنان که مشهود است بین وزن مخصوص غدد سیب‌زمینی و درصد ماده خشک آنها ارتباط مستقیمی وجود دارد به طوری که با افزایش مقدار ماده خشک، وزن مخصوص نیز افزایش می‌یابد (۱۳ و ۱۹). این موضوع توسط پژوهشگران دیگر در ارقام مختلف سیب‌زمینی به تأیید رسیده است (۶ و ۷). نتایج اندازه‌گیری میزان قندهای احیا کننده سیب‌زمینی با HPLC در جدول ۲ آورده شده است. ملاحظه

۱- رنگ که با دستگاه‌ها نترلب دیتاکالر مدل Text Flash ساخت آمریکا و اندازه‌گیری پارامترهای a, b و L سنجیده شد. فاکتور L شدت روشنایی (عدم تیرگی) یا ارزش رنگ خلال‌ها بوده، a تمایل به قرمزی یا سبزی و b تمایل به زردی یا آبی را نشان می‌داد. دامنه نوسان این دو متغیر بین ۱۰۰ و ۱۰۰- است و هرچه اعداد به سمت ۱۰۰ پیش روند تمایل به قرمزی و یا زردی بیشتر است. پارامتر L از صفر تا ۱۰۰ نوسان کرده و به ترتیب تیرگی تا روشنی را در نمونه‌ها نشان می‌داد. نیروی Shear به عنوان شاخص تعیین بافت به وسیله دستگاه اینستران مدل ۱۱۴۰ مورد ارزیابی قرار گرفت. خلال‌ها در سه نقطه با استفاده از تیغه مخصوص Warner Shear Bratzler بررسی شدند. عدد دستگاه برحسب گرم نیرو بوده که با تقسیم بر سطح مقطع خلال به صورت نیروی لازم برای ایجاد برش در واحد سطح بیان می‌شود و هر چه این عدد بالاتر باشد، مقاومت بافت در برابر نیروی برش بیشتر است (۱۰). درصد روغن جذب شده در خلال‌ها با روش سوکسله تعیین گردید که حلال مصرفی n- هگزان و زمان استخراج ۱۲ ساعت بود (۱۰). نتایج این تحقیق در طرح آماری

جدول ۳. اثر فرایند حرارتی و رقم سیب زمینی بر بافت فرنج فرایز

رقم سیب زمینی	تیمار حرارتی	نیروی shear بر حسب g/cm^2
آئولا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۱۹۵ ^a
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۱۴۲ ^c
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۹۰ ^f
	شاهد	۱۳۷ ^{cd}
آگریا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۱۷۰ ^b
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۹۲ ^f
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۶۲ ^g
	شاهد	۸۸ ^{fg}
آئوزونیا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۱۴۰ ^c
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۹۰ ^f
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۵۰ ^k
	شاهد	۸۷ ^f
مارفونا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۱۲۷ ^e
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۸۲ ^h
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۳۰ ^l
	شاهد	۷۸ ^{hi}

اعدادی که دارای حروف مشترک هستند بر پایه آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱٪ تفاوت معنی‌داری ندارند.

داری ندارند و در نهایت تیمار ۹۵ درجه - ۲ دقیقه است که کمترین میانگین نیرو را دارد. لذا فرایند حرارتی غده‌ها در شرایط ۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه مطلوب‌ترین بافت را در محصول ایجاد می‌کند ضمن آن که در تیمار ۹۵ درجه - ۲ دقیقه بافت خلال‌ها افت قابل توجهی می‌یابد (جدول ۳).

بسیاری از محققین معتقدند فرایند حرارتی مقدماتی در محدوده دمای ۷۰-۵۰ درجه سلسیوس سفتی بافت فرآورده‌های سرخ شده سیب‌زمینی را افزایش می‌دهد. بارتلمی، هوف و استنلی به فعال شدن آنزیم پکتین متیل استراز اشاره می‌کنند که در دماهای ۷۰-۵۰ درجه سلسیوس، فعالیت آن افزایش یافته و از ۷۵ درجه به بالا تضعیف می‌شود (۵ و ۱۸). مشخص شده

می‌شود رقم آئولا دارای بیشترین میزان قندهای احیا کننده است. در مقابل، رقم آگریا کمترین مقدار قندهای احیا کننده را دارد (جدول ۲).

ارزیابی اثر فرایند حرارتی مقدماتی بر بافت خلال‌های سیب‌زمینی نشان می‌دهد در میان ارقام مورد بررسی، رقم آئولا بیشترین مقاومت را در برابر نیروی برشی دارد. ارقام آگریا، آئوزونیا و مارفونا در مراتب بعدی هستند (جدول ۳). هم‌چنین ملاحظه می‌شود که در هر چهار رقم، تیمارهای حرارتی مختلف اثر متفاوتی بر بافت فرنج فرایز گذاشته‌اند. تیمار حرارتی ۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه بیشترین میانگین نیرو را به خود اختصاص داده است. تیمار ۷۰ درجه - ۴ دقیقه و نمونه شاهد تفاوت معنی

جدول ۴. اثر فرایند حرارتی ورقم سیب زمینی بر فاکتورهای رنگ فرنج فرايز

رقم سیب زمینی	تیمار حرارتی	L	a	b
آگریا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۷۰/۳۳ ^a	۶/۴۷ ^c	۴۴/۶۹ ^a
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۶۹/۸۵ ^{ab}	۵/۵۸ ^e	۴۳/۵۹ ^b
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۶۵/۲۷ ^{ef}	۴/۳۴ ^g	۴۰/۴۵ ^c
	شاهد	۶۴/۹۶ ^f	۱/۳۸ ^s	۳۸/۱۵ ^d
مارفونا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۶۸/۵۸ ^c	۷/۸۷ ^a	۳۴/۴۶ ^h
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۶۸/۵۶ ^c	۷/۰۱ ^b	۳۴/۳۴ ^h
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۵۷/۱۲ ^{jh}	۳/۱۲ ^h	۳۳/۰۶ ⁱ
	شاهد	۵۷/۱۲ ^j	۲/۹۰ ⁱ	۲۹/۶۸ ^{lm}
آئولا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۶۸/۳۵ ^{cd}	۶/۹۱ ^b	۳۶/۳۶ ^e
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۶۸/۴۶ ^{cd}	۶/۰۵ ^{cd}	۳۵/۹۰ ^{et}
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۶۰/۰۵ ^{gh}	۳/۰۲ ^h	۳۳/۳۲ ⁱ
	شاهد	۵۹/۷۶ ^{hi}	۲/۸۲ ⁱ	۳۱/۹۰ ^j
آئوزونیا	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۶۵/۸۴ ^e	۶/۱۱ ^{cd}	۳۶/۴۳ ^e
	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۶۵/۴۰ ^{ef}	۵/۳۹ ^{ef}	۳۶/۱۱ ^{ef}
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۶۰/۰۳ ^h	-۴/۱۵ ^k	۳۱/۳۷ ^{jk}
	شاهد	۵۹/۸۵ ^{hi}	-۳/۷۸ ^{kl}	۳۰/۰۱ ^l

اعدادی که دارای حروف مشترک هستند بر پایه آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح ۱٪ تفاوت معنی داری ندارند.

رنگ سنجی را به خود اختصاص داده است. ارقام مارفونا، آئولا و آئوزونیا در مراتب بعدی قرار دارند (جدول ۴). مطابق نتایج به دست آمده ملاحظه می‌شود تیمارهای حرارتی مختلف در سطح ۱٪ اثر معنی داری بر میزان روشنایی خلال‌های هر چهار رقم سیب‌زمینی گذاشته‌اند (جدول ۴). در ۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه بیشترین میزان روشنی (L) و بیشترین مقادیر فاکتورهای a, b به دست می‌آید.

جدول ۵ نشان می‌دهد میزان جذب روغن در خلال‌های رقم مارفونا بیشتر از ارقام دیگر است و رقم آئولا با بیشترین درصد ماده خشک، کمترین جذب روغن را دارد. با مقایسه این جدول و نتایج مربوط به ماده خشک و وزن مخصوص در غده‌ها، میزان جذب روغن در فرآورده‌های سرخ شده

در دماهای ۶۰-۷۵ درجه سانتی‌گراد به ویژه در ۷۰ درجه، تعداد بیشتری از گرانول‌های نشاسته ژلاتینه شده وکلسیم بیشتری آزاد می‌شود (۱۷). یون‌های کلسیم با گروه‌های کربوکسیل حاصل از عمل آنزیم پکتین متیل استراز واکنش داده، سفتی بافت محصول افزایش می‌یابد (۱۹ و ۲۰). زمان کافی فرایند حرارتی باعث توزیع مناسب یون‌های کلسیم در دیواره سلولی می‌شود. بنابراین قابل انتظار است که در شرایط ۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه سفتی بافت محصول بیشتر از تیمارهای دیگر باشد وازهم گسیختگی ناشی از پخت و جدا شدن سلول‌ها مهار گردد.

ارزیابی اثر فرایند حرارتی بر رنگ خلال‌های سیب‌زمینی نشان می‌دهد که رقم آگریا بیشترین مقادیر شاخص‌های

جدول ۵. اثر فرایند حرارتی و رقم سیب زمینی بر درصد جذب روغن فرنیج فرایز

رقم سیب زمینی	تیمار حرارتی	درصد جذب روغن
مارفونا	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۲۴/۵۸ ^a
	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۲۲/۶۰ ^d
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۲۳/۰۶ ^b
	شاهد	۲۳/۲۱ ^{bc}
آئوزونیا	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۲۳/۷۸ ^c
	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۲۱/۰۰ ^{fg}
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۲۱/۹۸ ^e
	شاهد	۲۲/۲۷ ^{de}
آگریا	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۲۱/۴۳ ^g
	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۱۹/۸۳ ⁱ
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۲۰/۵۴ ^h
	شاهد	۲۰/۶۸ ^h
آئولا	۹۵ درجه - ۲ دقیقه	۱۸/۰۳ ^j
	۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه	۱۵/۶۶ ^l
	۷۰ درجه - ۴ دقیقه	۱۶/۸۶ ^k
	شاهد	۱۶/۹۹ ^k

اعدادی که دارای حروف مشترک هستند بر پایه آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۱٪ تفاوت معنی داری ندارند.

شدن نیاز دارند و در نتیجه فرصت کمتری برای جذب روغن و تخریب رنگ در اختیار آنها می باشد. در یک ارزیابی کلی درباره تأثیر فرایند حرارتی مقدماتی بر شاخص های کیفی فرنیج فرایز و بر طبق نتایج جداول ۳ تا ۵ ملاحظه می شود در شرایط ۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه خصوصیات کیفی خلال های سیب زمینی شامل رنگ، بافت و درصد جذب روغن به طور چشمگیری بهبود می یابند لذا این تیمار به عنوان شرایط مطلوب فرایند حرارت مقدماتی در صنعت تولید فرنیج فرایز پیشنهاد می گردد. هم چنین با استناد به نتایج به دست آمده در جداول ۱ تا ۵، ارقام آئولا و آگریا در مجموع برای فرایند تولید خلال های نیمه سرخ منجمد سیب زمینی یا فرنیج فرایز معرفی می شوند.

سیب زمینی کاهش می یابد (۱۱، ۱۲ و ۱۳). طبق نتایج به دست آمده، محصول تیمار شده در آب ۹۵ درجه به مدت ۲ دقیقه بیشترین میزان روغن را جذب نموده است. حال آن که در شرایط ۷۰ درجه - ۱۰ دقیقه کمترین جذب روغن به دست آمد. تفاوت محسوسی بین درصد روغن جذب شده در محصول فرنیج فرایزی که تحت شرایط ۷۰ درجه - ۴ دقیقه تیمار شده با نمونه شاهد مشاهده نمی شود.

نتایج تحقیقات تالبورت نشان می دهد خلال های سیب زمینی با ۲۴٪ ماده خشک، جذب روغنی در حدود ۹٪ کمتر از خلال های با ۱۹٪ ماده خشک داشتند (۱۹). غدد با ماده خشک بالا به دلیل درصد رطوبت کمتر به زمان کوتاه تری برای سرخ

سپاسگزاری

قدردانی می‌گردد. هم‌چنین از آقای مهندس بهمن بهرامی و پرسنل آزمایشگاه علوم و صنایع غذایی برای همکاری در عملیات آزمایشگاهی این پژوهش سپاسگزاری می‌شود.

بدین‌وسیله از مسئولین پژوهشی دانشگاه و و سازمان برنامه بودجه استان اصفهان به‌خاطر تأمین بودجه این تحقیق تشکر و

منابع مورد استفاده

۱. دخانی، ش. و ل. ربیعی مطمئن. ۱۳۸۰. بررسی میزان تغییر قندها و اسیدهای آلی ارقام سیب‌زمینی (مورن، مارفونا و آگریا) استان اصفهان طی انبار داری با روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (۱)۵:۱۶۸-۱۷۳.
۲. ربیعی مطمئن، ل. ۱۳۷۶. مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی برخی از ارقام سیب‌زمینی استان اصفهان (مورن، مارفونا و آگریا) به صورت خام و فرایند شده طی مدت انبار داری سیب زمین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷ صفحه.
۳. فلاحی، م. ۱۳۷۶. دانش و تکنولوژی سیب‌زمینی. انتشارات بارثاوا، مشهد.
4. A.O.A.C.1980. Official Method of analysis of the association of analytic chemists. 12th ed, Washington D.C.
5. Bartolome, L.G. and G.E.Hoff. 1972. Firming of potatoes: biochemical effect of preheating. J. Agric and Food Chem. 20: 266-270.
6. Dokhani, Sh., B. Ooraikul, M. Placic and D. Hadziyev.1988. HPLC. Analysis of sugars in raw and processed potatoes. Iran Agric. Res. 7(1):23-36.
7. Gould, W.A., A. Baurodi and B.L. Hair. 1979. Evaluation of potato before and after storage regimes for chipping. Amer. Pot. J. 50:133-142.
8. Grazyna L. and G. Golubowska. 2005. Structural changes of potato tissue during French fries production. Food Chem. 93(4): 681-687.
9. Keijbets, M.J. and W.Plink. 1974. Beta-elimination of pectin in the presence of anions and cation. Carbohyd.33:359-362.
10. Khalil, A.M. 1999. Quality of French-fries potatoes influence by coating with hydrocolloids. J.Food Chem. 66(2):201-208.
11. Pinthus, E.J., P. Weinberg and L. S. Saguy. 1992. Gel-strength in restructured potato products affects oil uptake during deep-fat frying. J. Food Sci.57 (6):1359-1361
12. Pinthus, E.J. 1995. Criterion for oil uptake during deep-fat frying. J. Food Sci.58 (1):204-222.
13. Sayre, R.N., M. Nonaka and M.L. Weaver. 1975. French-fry quality related to specific gravity the same tuber.Am. Potato J. 52:73-81.
14. Somsen, D., A. Capelle and J. Tramper. 2004. Manufacturing of par- fried French-fries: part1: production yield as a function of number of tubers per kilogram. J. Food Eng. 61(2): 191-198.
15. Somsen, D., A. Capelle and J. Tramper. 2004. Manufacturing of par-fried French-fries: part 2: Modeling yield efficiency of peeling per kilogram. J. Food Eng. 61(2):199-207.
16. Smith, D.S., J.N.Cash, W.K.Nip and Y.H.Mui.1977. Processing Vegetable Sci. and Technol. Technomic Publishing. 237-285.
17. Spiess, W.E.L., G. Customidt and B. Putz. 1975. Starch 27:17-23.
18. Stanly, D.W., M.C. Bourne, A.P. Stone. 1995. Low temperature blanching effects on chemistry, firmness and structure of canned green beans and carrots. J. Food Sci.6:327-333.
19. Talburt, W.F. and M.S. Ora-Smith. 1975. Potato Processing. Third Edition. AVI Pub. Co., USA.
20. Zhang, Q. and J.N. Peterson. 1992. Vegetable blanching process modeling and control. ASAE Paper NO.926545. St. Joseph, Michigan.