

ارزیابی تحمل به شوری در سه رقم ذرت دانه‌ای

الیاس دهقان^۱ و احمد نادری^۲

چکیده

حدود یک میلیون هکتار از اراضی خوزستان چار مشکل شوری بوده و بخشی وسیعی از اراضی زیر کشت ذرت در جنوب استان در این مناطق قرار دارند. این تحقیق به منظور بررسی آثار شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه‌ای طی مدت دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (اهواز) در یک خاک سیلتی- کلی در دو آزمایش جداگانه اجرا شد. در آزمایش اول تیمارهای شوری در تمام طول دوره رشد اعمال شد. کرتهای اصلی شامل چهار سطح شوری آب آبیاری ۲، ۴، ۶ و ۸dS/m بود. در آزمایش دوم، اثر آبیاری با آب شور (EC=۸ dS/m) در مراحل مختلف رشد و نمو ذرت، شامل دوره‌های کاشت تا استقرار بوته‌ها (G1)، گل‌دهی و گرده افشاری (G2) و پر شدن دانه (G3)، بررسی شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که از نظر عملکرد دانه، وزن هزاردانه، درصد باروری بالا و درصد بوته‌های دارای بلال، بین همه سطوح شوری اختلاف بسیار معنی دار وجود داشت و بیشترین و کمترین عملکرد دانه، به ترتیب در سطوح شوری آب ۲ و ۶ dS/m آمد. تفاوت بین رقم‌ها و اثر متقابل شوری و رقم از نظر عملکرد دانه معنی دار بود و بیشترین عملکرد دانه از رقم‌های ۴ و ۶ در شوری ۲dS/m به دست آمد. نتایج آزمایش دوم نشان داد که ذرت در مراحل رشدی G1 و G3 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین حساسیت به شوری است. به طور کلی هیبریدهای ۶۴۷ و ۷۱۱ نسبت به شوری حساس‌تر از هیبرید ۷۰۴ ارزیابی شدند، اما به دلیل پتانسیل بالاتر و بر اساس عملکرد دانه تولید شده، کاشت هیبریدهای ۷۰۴ و ۷۱۱ توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: ذرت، آبیاری، آب شور، عملکرد، خوزستان

از ۶/۵ میلیون هکتار اراضی خوزستان نشان داده است که تنها ۱۵٪/۳ از اراضی مطالعه شده هیچگونه محدودیتی ندارند، در حالی که ۱۴٪/۷ از این خاک‌ها در کلاس دو قرار گرفته و دارای محدودیت‌های گوناگون، به ویژه شوری می‌باشند (۴). شوری عبارت است از غلظت بیش از حد املاح و عناصر معدنی در محلول آب یا خاک که منجر به تجمع نمک در ناحیه

مقدمه

هم اکنون منابع بزرگی از آبهای سطحی و زیرزمینی شور و نیمه شور وجود دارد که احتمالاً در آینده از آنها برای آبیاری استفاده خواهد شد. از جمله این آب‌ها می‌توان به رودخانه‌های جراحی و هندیجان دراستان خوزستان و شاپور و دالکی در استان بوشهر اشاره نمود (۳). مطالعات خاک‌شناسی حدود ۳۸٪

۱. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۲. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفوی آباد دزفول

مرحله جوانه زنی حساسیت زیادی به شوری دارد و افزایش شوری باعث کاهش جوانه زنی و تعداد بوته مستقر شده در واحد سطح می شود. با افزایش شوری، کاهش معنی داری در رشد و اجزای عملکرد به وجود می آید و در EC بیش از 8dS/m مهم ترین عامل محدود کننده برای گیاه، آب در دسترس می باشد (۷). عبود گزارش نمود که شوری در ذرت باعث کاهش نرخ رشد گیاه شده و ظهور گل های نر و ماده را به تأخیر می اندازد (۸).

رامادان و همکاران با بررسی اثر شوری بر جوانه زنی ذرت و سویا نتیجه گرفتند که ذرت از سویا مقاوم تر بوده و با افزایش شوری از $3/6$ به 11dS/m ، درصد جوانه زنی ذرت از $8/50$ به $12/50$ و سویا از $6/2$ به $2/2$ کاهش پیدا کرد (۲۲).

ماس و همکاران با بررسی حساسیت مراحل مختلف رشد ۱۶ رقم ذرت نسبت به شوری نتیجه گرفتند که ذرت در مرحله جوانه زنی نسبت به شوری نسبتاً متتحمل است و تا شوری 10dS/m جوانه زنی همه ارقام به جز دو رقم رضایت بخش بود. آنها در یک آزمایش گلخانه ای نیز 9 رقم ذرت را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که تا شوری $9/6\text{dS/m}$ میزان جوانه زنی تحت تأثیر قرار نگرفت اما مدت جوانه زنی افزایش یافت. آنها هم چنین گزارش دادند که مرحله گیاهچه ای ذرت نسبت به جوانه زنی به شدت به شوری حساس است. آستانه شوری برای عملکرد ماده خشک در بیشتر ارقام برابر 1dS/m و میزان کاهش محصول به ازای هر واحد افزایش شوری در مرحله گیاهچه ای برابر $4/9$ بود. آستانه تحمل به شوری برای عملکرد دانه در مرحله گیاهچه ای بالاتر بود، به طوری که میزان کاهش محصول به ازای هر واحد افزایش شوری از آستانه برای ذرت شیرین رقم بونanza (Bonanza) به ترتیب برابر $5/8\text{dS/m}$ و $7/7$ و برای ارقام دانه ای برابر $5/5\text{dS/m}$ و $10/1$ بود. افزایش شوری آب آبیاری تا 9dS/m در مراحل ظهور کاکل و خمیری دانه کاهش معنی دار در عملکرد ایجاد نکرد (۱۷).

هاشمی دزفولی و همکاران (۶) معتقدند، مقاومت گیاهان به شوری به سه روش قابل ارزیابی است: ۱- توانایی گیاه از

ریشه شده و گیاه را در جذب آب کافی از خاک، چهار مشکل می کند (۱). درک کمی تولید محصول، تحت شرایط کمبود آب و آبیاری با آب شور بر سه فرضیه اساسی استوار است: اولاً افزایش شوری به بالاتر از آستانه تحمل گیاه باعث کاهش محصول می شود (۹ و ۱۵)، ثانیاً میزان بیومس تولیدی با تعرق رابطه خطی دارد (۹ و ۲۳)، ثالثاً اثرات استرس شوری و آبیاری بر عملکرد تجمعی است (۹، ۱۰ و ۲۱).

برخی مدیریت های زراعت در مناطق شور شامل انتخاب گیاهان مقاوم به شوری، برگزیدن روش کاشت مناسب، تهیه بستر بذر به صورت شبیه دار، انتخاب روش آبیاری مناسب، افزایش مواد آلی خاک، استفاده از زیر شکن و غیره بود، لیکن مؤثر ترین راه مقابله با پدیده شوری استفاده از گیاهان مقاوم می باشد (۳).

لگومینزرها، ذرت، چغندر قند، گندم، یونجه، چاودار و جو به ترتیب از کمترین تا بیشترین مقاومت را نسبت به شوری دارند (۱). آستانه کاهش محصول در اثر شوری در گیاهان مختلف متفاوت است و خود می تواند یکی از روش های ارزیابی تحمل به شوری باشد. آستانه تحمل ذرت، گندم، جو، پنبه و چغندر قند به ترتیب $1/7$ ، $6/7$ و $7/7$ و 7dS/m شده است (۱۶).

هافمن و همکاران در ایالت کالیفرنیای امریکا با بررسی پایداری تحمل ذرت نسبت به شوری گزارش نمودند که میانگین شوری محلول خاک در محدوده ریشه در طول فصل رشد تا $3/7\text{dS/m}$ باعث کاهش عملکرد نشد، اما به ازای هر واحد افزایش بیشتر شوری عملکرد دانه به میزان $14/1$ % کاهش نشان داد. این کاهش ناشی از کاهش در تراکم بوته و جرم دانه بود (۱۳).

آستانه حساسیت ذرت نسبت به شوری آب $1/1$ و خاک $1/7\text{dS/m}$ بوده و میزان کاهش محصول دانه به ازای هر واحد افزایش شوری خاک، معادل $12/1$ % می باشد، لذا ذرت از گیاهان نیمه حساس به شوری به شمار می رود (۲).

همستگی ضعیفی بین تحمل به شوری در مراحل جوانه زنی و دیگر مراحل رشد مشاهده شده است (۳ و ۱۸). ذرت در

بررسی قرار گرفت (ویژگی‌های خاک محل اجرای آزمایش در جدول ۱ آورده شده است).

در آزمایش اول، تیمارهای شوری در تمام طول دوره رشد گیاه اعمال شده و آزمایش به صورت کرت‌های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت‌های اصلی شامل چهار سطح شوری آب آبیاری ۲، ۴، ۶ و ۸dS/m و کرت‌های فرعی شامل سه رقم هیبرید سینگل کراس ذرت ۷۰۴، ۷۱۱ و ۶۴۷ بود. در آزمایش دوم، به منظور بررسی امکان استفاده مقطوعی از آب‌های نسبتاً شور منطقه برای آبیاری ذرت، اثر آبیاری مقطوعی با آب شور (EC=۸ dS/m) بر مراحل مختلف رشد و نمو ذرت، شامل دوره‌های کاشت تا استقرار بوته‌ها (G1)، گل‌دهی و گرده افشاری (G2) و پر شدن دانه (G3)، بررسی شد. علاوه بر این یک تیمار آبیاری با آب معمولی در تمام طول دوره رشد نیز به عنوان شاهد (G0) در نظر گرفته شد. کشت در هر یک از کرت‌های فرعی شامل ۴ ردیف به طول ۵ متر، با فاصله ردیف ۷۵ سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف ۱۸ سانتی‌متر انجام گردید. کاشت در نیمه اول مردادماه انجام شد، اما اعمال تیمارهای شوری پس از جوانه زدن بذور و استقرار گیاهچه‌ها آغاز گردید. کود مصرف شده بر اساس آزمون خاک شامل فسفات آمونیوم، سولفات پتاسیم و اوره بوده و همه‌ی کود فسفاته و سولفاته و٪ ۴۰ کود اوره به صورت پایه و به روش پخشی و٪ ۶۰ کود اوره به صورت سرک در زمان ۷-۸ برگه شدن بوته‌ها به صورت نواری مصرف شد. در هر دو آزمایش، روش اعمال شوری به این صورت بود که ابتدا محلول نمک (که از معادن نمک منطقه فراهم شده بود) با غلظت‌های بسیار بالا در مخزن‌های ۲۰۰ لیتری تهیه شده و در زمان آبیاری مزرعه، در فاصله ۳۰ متر مانده به مزرعه، محلول نمک از مخزن به کanal وارد و کاملاً با آن مخلوط می‌شد. میزان شوری آب آبیاری توسط شوری سنجد صحراوی و با تنظیم میزان ورود محلول نمک از مخزن به کanal و بالحاظ کردن شوری اولیه خاک انجام می‌شد. لازم به ذکر است که شوری آب رودخانه کارون در زمان اجرای آزمایش حدود ۲dS/m بود.

نظر حفظ بقا در خاک‌های شور ۲- رشد مطلق یا عملکرد گیاه ۳- رشد نسبی یا عملکرد در خاک شور در مقایسه با رشد یا عملکرد آن در خاکی که شور نیست. از میان این روش‌ها، معیار عملکرد نسبی (روش سوم) از بقیه بهتر بود و توصیف بهتری را از مقاومت گیاه بیان می‌کند.

تحمل به شوری معمولاً از نسبت بیوماس تولیدی (عملکرد) در شرایط شور به بیوماس تولیدی در شرایط شاهد (بدون شوری) در طول یک دوره زمانی تعیین می‌شود. بر اساس معادله ۱، تحمل به شوری (S) را می‌توان به عنوان کاهش در عملکرد در یک شوری مشخص (Y_s) در رابطه با عملکرد اندازه‌گیری شده در شرایط بدون شوری (Y_c) تعریف نمود (۵).

$$[1] \quad S = (Y_s / Y_c)$$

شدت تنش به طور معمول با مؤلفه حساسیت به تنش بیان می‌شود و بر اساس تعریف فیشر و ماثورر (۱۲)، ضریب حساسیت رقم‌ها با استفاده از معادله‌های ۲ و ۳ محاسبه می‌شود.

$$[2] \quad SSI = \frac{1 - \left(\frac{Y_s}{Y_c} \right)}{1 - \left(\frac{Y_d}{Y_p} \right)}$$

در این معادله، SSI شاخص حساسیت هر رقم به تنش، Y_d و Y_p به ترتیب میانگین عملکرد رقم در شرایط تنش و بدون تنش، \bar{Y}_d و \bar{Y}_p به ترتیب میانگین کل رقم‌ها در شرایط تنش و بدون تنش می‌باشد.

هر چه مقدار SSI کوچک‌تر باشد نشان‌دهنده حساسیت کمتر به شرایط تنش بوده و اگر این مقدار از ۱ کمتر باشد نشان‌دهنده تحمل رقم به تنش می‌باشد. این عدد می‌تواند برای مقایسه گیاهان مختلف در شرایط یکسان شوری مورد استفاده قرار گیرد. این آزمایش برای ارزیابی ارقام ذرت مورد کشت در منطقه از نظر تحمل به شوری طراحی گردید.

مواد و روش‌ها

در دو آزمایش جداگانه در مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (اهواز)، طی مدت دو سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در یک خاک سیلتی - کلی با شوری متوسط ۵dS/m، آثار شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت دانه‌ای مورد

جدول ۱. مشخصات خاک ایستگاه تحقیقات کشاورزی اهواز

(cm)	اعماقی بافت خاک (رسی) (%)			EC (ds.m ⁻¹)	pH	K (mg.kg ⁻¹)	P (mg.kg ⁻¹)	OC (%)	عناصر میکرو و قابل جذب (mg.kg ⁻¹)			
	رس	سیلت	شن						Fe	Mn	Zn	Cu
۰-۳۰	۴۶	۴۴	۱۰	۵	۷/۲	۲۷	۹/۶	۰/۶۲	۱۱/۲	۷/۳	۱	۱/۷

تیماری هیبریدهای ۷۰۴ و ۷۱۱ در سطح شوری ۲dS/m و کمترین آن به میزان ۱/۱۶۹ تن در هکتار از هیبرید ۷۱۱ در شوری ۸dS/m به دست آمد (جدول ۳). مقایسه میانگین عملکرد دانه روش نمود که بین همهی سطوح شوری اختلاف معنی دار وجود داشته و با افزایش شوری از ۲ به ۴، ۶ و ۸dS/m عملکرد دانه همواره روندی کاهشی داشته و به ترتیب ۵۲ و ۵۰ و ۷۸ درصد کاهش نشان داد (شکل ۱).

میزان کاهش در عملکرد به ازای هر واحد افزایش در شوری نسبت به شاهد برای ارقام ۷۰۴، ۷۱۱ و ۶۴۷ به ترتیب برابر با ۱۳، ۱۳ و ۱۲/۵ درصد و میانگین آنها برابر با ۱۳٪ بود. این نتیجه با یافته های هافمن و همکاران (۱۳) همخوانی دارد.

نتایج نشان داد که بین صفات مورد بررسی، همبستگی بسیار معنی داری وجود دارد (جدول ۵). نتایج رگرسیون نیز روش نمود که وزن هزاردانه و درصد بوته های دارای بالا، به ترتیب با ضریب تبیین ۹۳ و ۹۰ درصد، مهم ترین جزء تعیین کننده عملکرد می باشند (جدول ۶). در این تحقیق، افزایش ناچیز وزن هزار دانه در شرایط تنش نتوانسته است اثر منفی افزایش در تعداد بوته ضعیف و بدون بالا و درصد بوته های دارای بالا بر عملکرد دانه را به طور کامل جبران نماید.

بررسی شاخص حساسیت به تنش شوری (فیشر و مائورر ۱۲ و ۱۹) در هیبریدهای مورد بررسی روش نمود که در شرایط تنش ملایم (شوری آب ۴dS/m)، هیبرید ۷۰۴ حساس و هیبریدهای ۶۴۷ و ۷۱۱ نسبتاً متتحمل بودند، لیکن با تشدید تنش، میزان حساسیت به تنش در هیبریدهای ۷۰۴ و ۷۱۱ با شدت بیشتری افزایش یافت به طوری که اختلاف عملکرد ارقام در شوری ۸dS/m به کمترین مقدار خود رسیده است (شکل ۱). با توجه به بالا بودن پتانسیل عملکرد دانه در هیبرید

اندازه گیری صفات مورد بررسی شامل عملکرد دانه با رطوبت ۱۴٪، وزن هزاردانه، درصد باروری بالا و درصد بوته های دارای بالا با برداشت محصول از خطوط میانی هر کرت و پس از حذف نیم متر از بالا و پائین ردیف ها انجام شد. درصد باروری بالا از نسبت طول ردیف دانه ها به طول چوب بالا در ۱۰ بالا تصادفی محاسبه شد. همچنین درصد بوته های دارای بالا عبارت بود از نسبت تعداد بوته های دارای بالا به تعداد کل بوته های مستقر شده در واحد سطح.

در پایان میزان حساسیت هیبریدهای مورد بررسی نسبت به تنش شوری با استفاده از معادله ۲ ارزیابی گردید و تجزیه واریانس مرکب داده ها توسط نرم افزار MstatC و مقایسه میانگین دو ساله به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

نتایج و بحث

الف) عملکرد دانه

تجزیه واریانس دو ساله داده ها نشان داد که از نظر عملکرد دانه، تفاوت بین سال، سطوح شوری آب آبیاری و همچنین هیبریدهای مورد بررسی در سطح ۱٪ اثر متقابل تیمارها در سطح ۵٪ معنی دار بود (جدول ۲). علی رغم وجود تفاوت معنی دار بین دو سال از نظر عملکرد دانه، تغییرات عملکرد در دو سال هم جهت بوده و باعث شده است تفاوت معنی دار بین تیمارها در تجزیه مرکب نیز دیده شود.

از نظر عملکرد دانه، هیبریدهای ۷۰۴ و ۷۱۱ ضمن قرار گرفتن در یک گروه، از هیبرید ۶۴۷ برتر بودند و هیبرید ۶۴۷ تنها ۸/۸٪ از عملکرد هیبرید شاهد ۷۰۴ با محصول ۳/۷۳۲ تن در هکتار را تولید نمود (جدول ۳). بیشترین عملکرد دانه به میزان ۶۰۹۵ و ۵/۷۱۰ تن در هکتار به ترتیب از ترکیب های

جدول ۲. نتایج تجزیه واریانس دو ساله میانگین مربعات اثر سطوح مختلف شوری و رقم بر عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی

منابع	درجه آزادی	مقادیر میانگین مربعات (MS) برای صفات مورد بررسی		
		عملکرد دانه (تن در هکتار) باروری بالا (درصد)	وزن هزار دانه (گرم) بوته‌های دارای بالا (درصد)	۱۳۸/۸۸۹ ^{ns}
سال	۱	۶/۰۰ ^{**}	۸۲/۳۴۷ ^{ns}	۳۶/۱۲۵ ^{ns}
سال (تکرار)	۴	۰/۲۶۲	۹۹/۶۹۴	۴۱/۷۷۸
شوری آب	۳	۶۴/۸۴۳ ^{**}	۵۱۷۱/۴۲۶ ^{**}	۳۹۵۹/۴۹۵ ^{**}
شوری در سال	۳	۱/۷۰۰ ^{**}	۱۲۶/۸۵۲ ^{ns}	۱۰۵/۷۵۵ ^{ns}
خطای آزمایش	۱۲	۰/۲۰۵	۱۷۴/۹۷۲	۳۶/۳۸۹
هیبرید	۲	۲/۸۵۸ ^{**}	۲۸/۰۴۲ ^{ns}	۴۴/۳۴۷ ^{ns}
هیبرید در سال	۲	۰/۳۰۰ ^{ns}	۹۷/۵۹۷ ^{ns}	۱۵/۰۴۲ ^{ns}
اثر مقابل	۶	۰/۵۴۰ [*]	۱۷/۰۷۹ ^{ns}	۵۷/۶۶۳ ^{ns}
هیبرید در شوری در سال	۶	۰/۲۸۷ ^{ns}	۷۹/۴۴۹ ^{ns}	۱۷/۱۷۱ ^{ns}
خطای آزمایش	۳۲	۰/۱۹۸	۱۱۵/۸۴۰	۲۹/۸۱۹
ضریب تغییرات (C. V.)		٪/۱۲/۹۲	٪/۱۴/۸۳	٪/۶/۶۳

* و **: به ترتیب، معنی دار در سطح ۵٪ و ۱٪. n.s: غیر معنی دار

جدول ۳. مقایسه و کلاس‌بندی میانگین دو ساله صفات مورد بررسی در سطوح مختلف تیمار شوری، رقم و اثر مقابل آنها

تیمار	میانگین صفات و مقایسه آنها با آزمون دانکن (سطح احتمال ۰/۵%)		
	عملکرد دانه (تن در هکتار)	باروری بالا (درصد)	وزن هزار دانه (گرم) بوته‌های دارای بالا (درصد)
شوری آب (dS/m)			
۹۷ ^a	۳۲۴ ^a	۹۰ ^a	۵/۴۹۹ ^a
۹۰ ^b	۲۸۰ ^b	۸۲ ^a	۴/۴۱۶ ^b
۸۰ ^c	۲۱۰ ^c	۶۶ ^b	۲/۶۶۶ ^c
۶۳ ^d	۱۶۶ ^d	۵۲ ^c	۱/۲۰۰ ^d
هیبرید			
۸۳ ^a	۲۴۷ ^a	۷۱ ^a	۳/۷۳۲ ^a
۸۱ ^a	۲۵۰ ^a	۷۳ ^a	۳/۵۴۲ ^a
۸۳ ^a	۲۳۷ ^a	۷۳ ^a	۳/۰۶۱ ^b
اثر مقابل تیمارها			
۹۸ ^a	۳۰۵ ^{bc}	۸۱ ^{ab}	۶/۰۹۵ ^a
۹۶ ^a	۳۵۳ ^a	۹۵ ^a	۵/۷۱۰ ^a
۹۶ ^a	۳۱۲ ^b	۹۵ ^a	۴/۶۹۱ ^b
۹۱ ^{ab}	۲۸۸ ^{bc}	۸۳ ^{ab}	۴/۵۸۹ ^b
۸۹ ^{ab}	۲۸۳ ^{bc}	۸۱ ^{ab}	۴/۶۳۰ ^b
۹۰ ^{ab}	۲۷۱ ^c	۸۲ ^{ab}	۴/۰۳۰ ^c
۸۴ ^{bc}	۲۱۷ ^d	۶۸ ^c	۲/۹۹۵ ^d
۷۸ ^c	۲۰۳ ^d	۷۰ ^{bc}	۲/۶۵۹ ^{de}
۷۹ ^c	۲۱۰ ^d	۶۲ ^{cd}	۲/۳۴۴ ^e
۶۰ ^d	۱۷۹ ^{de}	۵۴ ^d	۱/۲۴۸ ^f
۶۰ ^d	۱۶۱ ^e	۴۸ ^d	۱/۱۶۹ ^f
۶۸ ^d	۱۵۷ ^e	۵۳ ^d	۱/۱۸۴ ^f

*: در هر ستون تفاوت بین میانگین‌هایی که حداقل یک حرف مشترک دارند معنی دار نیست.

جدول ۴. مقدار شاخص حساسیت به تنش شوری فیشر و مائورر در هیبریدهای مورد مطالعه

سطح شوری (dS/m)			هیبرید
۸	۶	۴	
۱/۰۲	۱/۰۰	۱/۲۸	۷۰۴
۱/۰۲	۱/۰۰	۰/۹۹	۷۱۱
۰/۹۶	۰/۹۸	۰/۷۴	۶۴۷
۰/۷۸	۰/۵۱	۰/۱۹	تنش محیطی (یا ضریب کاهش متوسط عملکرد ارقام)

جدول ۵. نتایج همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط تنش شوری

=	عملکرد دانه	درصد باروری بالا	وزن هزار دانه
درصد باروری بالا	۰/۹۲**		
وزن هزار دانه	۰/۹۷**	۰/۹۷**	
درصد بوتهای دارای بالا	۰/۹۵**	۰/۹۴**	۰/۹۲**

**: تفاوت معنی دار در سطح ۰.۱

جدول ۶. معادلات رگرسیون بین عملکرد دانه و صفات وابسته به آن


رگرسیون		
روش	معادله*	ضریب تبیین
ساده	$GY = -2/94 + 0/0261W$	$R^2 = 0/93$
ساده	$GY = -2/91 + 0/101F$	$R^2 = 0/84$
ساده	$GY = -4/71 + 0/0253E$	$R^2 = 0/90$
چندگانه (گام به گام)	$GY = -4/91 + 0/0253W - 0/00576+F + 0/0746E$	$R^2 = 0/96$

*: GY، F، W و E به ترتیب علائم اختصاری برای عملکرد دانه، وزن دانه، درصد باروری بالا و درصد بوتهای دارای بالا می باشد.

سازی شرایط برای حصول عملکرد بالاتر در هیبریدهای پر پتانسیل از حساسیت بیشتری برخوردار است.

ب) درصد باروری بالا

تجزیه واریانس مرکب مشخص نمود که از نظر درصد باروری بالاها، اختلاف بین سطوح مختلف شوری بسیار معنی دار بود، اما تفاوت بین هیبریدها و اثر متقابل تیمارها معنی دار نبود (جدول ۲). مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش شوری آب از ۲ به ۴ dS/m، درصد باروری بالا کاهش نیافت اما در شوری های بالاتر کاهش معنی دار نشان داد. بیشترین و کمترین درصد باروری بالا به میزان ۹۰ و ۵۲ درصد، به ترتیب در شوری های ۲ و ۸ dS/m به دست آمد (جدول ۳).



شکل ۱. روند کاهش عملکرد ارقام ذرت با افزایش شوری

۷۰۴ نسبت به دو هیبرید دیگر، به نظر می رسد با تشدید تنش، توانایی هیبریدهای با پتانسیل عملکرد بالاتر برای استفاده از عوامل مؤثر در تولید کاهش می یابد، به عبارت دیگر بهینه

آب شور 8dS/m به صورت مقطعی در مراحل کاشت تا قبل از گل‌دهی (G1)، گل‌دهی و گردهافشانی (G2) و پر شدن دانه (G3) نسبت به شاهد G0 (آبیاری با آب معمولی 2dS/m) تمام دوره رشد با میانگین عملکرد $5/870$ تن در هکتار، به ترتیب باعث کاهش عملکرد دانه به میزان ۲۵، ۲۴ و ۱۴ درصد شد (جدول ۷).

به طور کلی در ارقام مورد بررسی، کمترین تحمل نسبت به آبیاری با آب شور و بیشترین کاهش در عملکرد دانه به میزان ۲۵ درصد در مرحله کاشت تا استقرار بوته (قبل از گل‌دهی) به دست آمد (جدول ۷). اعمال شوری در این مرحله باعث تضعیف و از بین رفتن تعدادی از گیاهچه‌ها شده و ناتوانی ذرت در تولید پنجه، باعث کاهش تعداد کل ساقه‌های بلال دهنده و درصد بوته‌های دارای بلال شده و در نتیجه عملکرد دانه کاهش یافته است (شکل ۲). این نتایج با یافته‌های ماس و همکاران و فرح و همکاران در خصوص کاهش جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه ذرت در اثر افزایش شوری آب آبیاری مطابقت دارد (۱۱ و ۱۷).

کاهش عملکرد دانه به میزان ۲۴ درصد در اعمال آبیاری با آب شور در مرحله گل‌دهی و گردهافشانی نیز نشان‌دهنده حساسیت ارقام مورد بررسی نسبت به شوری در این مرحله است. در این مرحله شوری بیشترین اثر کاهنده را بر درصد باروری بلال‌ها بر جای گذاشت (شکل ۳).

ذرت در مرحله گل‌دهی نسبت به کمبود رطوبت و تنش خشکی حساسیت زیادی داشته و بروز اثر شوری به صورت تنش خشکی، می‌تواند باعث از بین رفتن دانه‌های گرده و کاهش شناسی باروری گل‌ها شود. این نتایج با یافته‌های مونوس (۱۹)، عبود (۸) و مورامکار و همکاران مبنی بر معنی دار نبودن اثر شوری تا 9dS/m توسط ماس و همکاران مقایسه شده است. این نتایج به دست آمده در مطابقت دارد اما با نتایج به دست آمده در مرحله گل‌دهی و خمیری دانه مغایرت دارد. انجام آبیاری با آب شور 8dS/m در مرحله پر شدن دانه نسبت به مراحل دیگر به میزان کمتری باعث کاهش عملکرد شده است. زیرا بخش مهمی از اجزای تعیین کننده عملکرد مانند تعداد بوته و بلال در واحد سطح و تعداد

معنی دار نشدن تفاوت سطوح اثر متقابل شوری و هیبرید از نظر درصد باروری بلال نشان داد که اثر کاهنده افزایش شوری بر درصد باروری بلال در هیبریدهای مورد بررسی، هم راستا و دارای شیب یکنواخت بوده است. این نتایج با یافته‌های مونوس (۱۹)، عبود (۸) و مورامکار و همکاران (۲۰) مطابقت دارد. وجود شوری، به ویژه در زمان گل‌دهی و گردهافشانی، می‌تواند با کاهش توانایی گیاه در جذب آب و بروز تنش رطوبتی، پایداری دانه‌های گرده و درصد باروری بلال‌ها را کاهش دهد.

ج) وزن هزاردانه

نتایج به دست آمده نشان داد که از نظر وزن هزاردانه، تفاوت بین سطوح مختلف شوری در سطح $1/1$ ٪ معنی دار بود، اما تفاوت بین هیبریدها و اثر متقابل شوری و هیبرید معنی دار نبود (جدول ۲). در شوری‌های بالاتر، با کاهش درصد باروری بلال، انتظار می‌رفت که با کم شدن تعداد دانه و توزیع منابع تأمین کننده وزن دانه در بین دانه‌های کمتر، وزن هزار دانه افزایش یابد، لیکن در همه هیبریدها با تشدييد تنش شوری، اندازه بوته‌ها و بلال‌ها کوچک‌تر شده و تولید مواد فتوستيتزی و وزن هزار دانه کاهش یافته است (جدول ۳).

د) درصد بوته‌های دارای بلال

تجزیه واریانس مرکب داده‌ها مشخص نمود که از نظر درصد بوته‌های دارای بلال، اختلاف بین سطوح مختلف شوری در سطح $1/1$ ٪ معنی دار بود، اما بین ارقام و اثر متقابل شوری و رقم تفاوت معنی دار وجود نداشت (جدول ۲).


مقایسه میانگین‌ها مشخص نمود که از نظر درصد بوته‌های دارای بلال، بین همه سطوح شوری اختلاف معنی دار وجود داشته و با افزایش شوری آب آبیاری، این روند کاهشی شدیدتر شده و درصد بوته‌های ضعیف و بدون بلال افزایش یافته است (جدول ۳).

نتایج اعمال شوری در مراحل مختلف رشد و نمو


نتایج به دست آمده از آزمایش دوم نشان داد که اعمال آبیاری با

جدول ۷. نسبت عملکرد دانه ارقام ذرت تحت تأثیر آبیاری با آب شور (8dS/m) به صورت مقطعی به عملکرد شاهد (شوری 9dS/m)


رقم	عملکرد دانه در شوری شاهد (تن در هکتار)	مرحله اعمال شوری		
		G1 (کاشت تا قبل از گلدهی)	G2 (گلدهی و گرداده‌افشانی)	G3 (پرکردن دانه)
۷۰۴	۶/۸۵	۰/۶۸	۰/۶۴	۰/۸۳
۷۱۱	۵/۹۹	۰/۶۸	۰/۷۴	۰/۷۲
۶۴۷	۴/۹۴	۰/۸۵	۰/۸۹	۰/۹۸
میانگین	۵/۹۳	۰/۷۲	۰/۷۴	۰/۸۲



شکل ۳. اثر آبیاری مقطعی با آب شور در مراحل مختلف رشد و نمو بر درصد باروری بلال ارقام ذرت



شکل ۲. اثر آبیاری مقطعی با آب شور در مراحل مختلف رشد و نمو بر درصد بوته‌های دارای بلال ارقام ذرت



شکل ۴. اثر آبیاری مقطعی با آب شور در مراحل مختلف رشد و نمو بر وزن هزاردانه ارقام ذرت

- ۲- کشت ارقام مورد بررسی در این آزمایش در شوری 4dS/m و بالاتر از آن به دلیل ایجاد کاهش معنی‌دار در عملکرد توصیه نمی‌شود.
- ۳- در شوری 8dS/m عملکرد نهایی هیریدهای ۷۰۴ و ۷۱۱ با وجود تحمل کمتر نسبت به شوری، به دلیل پتانسیل تولید

دانه در بلال در مراحل قبلی معین و ثابت شده است. ماس و همکاران نیز گزارش نمودند، افزایش شوری آب آبیاری تا 9dS/m در مراحله خمیری دانه کاهش معنی‌دار در عملکرد ذرت ایجاد نکرد (۱۷). با این وجود در مرحله پر شدن دانه، وزن هزاردانه بیش از دیگر صفات تحت تأثیر شوری آب قرار گرفته و کاهش عملکرد دانه بیشتر ناشی از کاهش وزن هزار دانه بوده است (شکل ۴)، کاهش وزن هزار دانه می‌تواند ناشی از بروز اختلال در جذب آب و مواد غذایی و کاهش در تولید مواد فتوسنتزی برای انتقال به دانه‌ها باشد.

در بین ارقام مورد بررسی، هیرید ۶۴۷ در همه مراحل بیشترین تحمل را نسبت به آبیاری با آب شور نشان داد. در حالی که ارقام ۷۰۴ و ۷۱۱ به ویژه در مراحل کاشت و گلدهی حساسیت بیشتری به شوری آب نشان دادند.

نتیجه‌گیری

- ۱- هیرید ۶۴۷ نسبت به شوری از هیریدهای ۷۰۴ و ۷۱۱ متحمل‌تر است.

سپاسگزاری

از شورای پژوهش‌های علمی کشور به خاطر فراهم نمودن امکانات اجرای این طرح پژوهشی سپاسگزاری می‌شود.

دانه بالاتر، از هیبرید ۶۰۴ بیشتر است.

۴- انجام آبیاری با آب شور 8dS/m در مرحله پر شدن دانه نسبت به مراحل دیگر به میزان کمتری باعث کاهش عملکرد ذرت می‌شود.

منابع مورد استفاده

۱. جعفری، م. ۱۳۶۹. شوری و اثرات آن در خاک و گیاه. جهاد دانشگاهی تهران.
۲. علیزاده، ا. ۱۳۶۴. کیفیت آب در آبیاری. انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
۳. حیدری شریف آباد، ح. ۱۳۸۰. گیاه و شوری. نگارش. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، تهران.
۴. طاهرزاده، م. ح. ۱۳۸۳. تعیین پراکنش خاک‌های شور و سدیمی خوزستان به کمک RS-GIS و بررسی روش اصلاح و بهسازی آنها با استفاده از آب معمولی و آب شور. مجموعه مقالات سمینار آب، کشاورزی و چالش‌های آینده. صفحه‌های ۶۴-۸۵ (سمینار آب، کشاورزی و چالش‌های آینده. دزفول. مرکز تحقیقات کشاورزی صفوی آباد. ۲۸-۲۹ بهمن ۱۳۸۲).
۵. میرمحمدی میدی، س، ع. م. و ب. قره‌یاضی. ۱۳۸۱. جنبه‌های فیزیولوژیک و بهنژادی تنفس شوری گیاهان. مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان.
۶. هاشمی دزفولی، ا. ع. کوچکی و م. بنایان. ۱۳۷۴. افزایش عملکرد گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
7. Abdul halim, R. K., H. M. Salih, A. A. Ahmad and A. M. Abdul Rahman. 1988. Growth and development of Maxipak wheat as affected by soil salinity and moisture levels. *Plant and Soil* 112: 255-259.
8. Abood, MA. A. 1978. Analysis of corn yield components for salinity and moisture treatments. *Dissert. Abs. Int.* 38:(12): 5683.
9. Bresler, E. 1987. Application of conceptual model to irrigation water requirement and salt tolerance of crops. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 51: 788-793.
10. Cardon, G.E. and J. Letey. 1994. Plant water uptake terms evaluated for soil water and solute movement models. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 32:1876-1880.
11. Farah, M. A. M. F. Soliman and I. M. Antar. 1981. Seed germination and root growth of corn and cotton seedling as affected by soil texture and salinity of irrigation water. *Agric. Res. Rev.* 59: (4) 157-169.
12. Fischer, R. A. and R. Maurer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yield responses. *Aust. J. Agric. Res.* 29:897-912.
13. Hoffman, G. J. E. V. Mass, T. L. Prichard and J. L. Meyer. 1983. Salt tolerance of corn in the Sacramento-San Joaquin Delta of California. *Irrig. Sci.* 4: 31 – 44.
14. Letey, J. and A. Dinar. 1986. Simulated crop-production functions for several crops when irrigated with saline waters. *Hilgardia* 54:1-32.
15. Mass, E.V. 1990. Crop Salt Tolerance. In: K.K. Tanji (Ed.), *Agricultural Salinity Assessment and Management*. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 71, Am. Soc. Civil Engineers, New York.
16. Mass, E. V. 1986. Crop tolerance to saline soil and water. Proe. US Pak Biosaline Res. Workshop, Karachi, Pakistan.
17. Mass, E. V., G. J. Hoffman, G. D. Chaba, J. A. Posc and M. C. Shannon. 1983. Salt sensitivity of corn at various growth stages. *Irrig. Sci.* 4: 45 – 74.
18. Mozafar, A. and J. R. Goodin. 1986. Salt tolerance of two different drought tolerance wheat genotypes during germination and early seedling growth. *Plant and Soil* 96:303-316.
19. Munus, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. *Plant, Cell and Environ.* 25: 239-250.
20. Murumkar, C. V. and P. D. Chavan. 1989. Influence of salt stress on biochemical processes in chickpea (*Cicer arietinum*). *Plant and Soil* 96:439-443.
21. Pang, X.P. and J. Letey. 1998. Development and evaluation of ENVIRO-GRO, an integrated water, salinity and nitrogen model. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 62:1418–1427.
22. Ramadan, H., S. A. Al-Niemi and Y. K. Al-Handathi. 1986. Salinity and seed germination of corn and soybean. *Agriv. Sci. Iraq* 4(2): 97-102.