

کاربرد مدل‌های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک‌های شمال و شمال‌غرب ایران

محمدرضا شعبی نوبریان^{۱*}، حسین ترابی گل‌سفیدی^۲ و صابره دربندی^۳

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۷/۲۴؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۷/۱)

چکیده

گنجایش تبادل کاتیونی در خاک مجموع نقاط تبادلی کلونیدهای آلی و معدنی خاک است. مدل‌سازی و تخمین گنجایش تبادل کاتیونی یک شاخص مفید برای حاصلخیزی خاک می‌باشد. از رویکردهای جدید جایگزین شده برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی، روش‌های غیرمستقیم و مبتنی بر مدل‌های هوشمند است. در این مطالعه، به منظور تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی، تعداد ۴۸۵ نمونه خاک از دو منطقه چپرسر (مازندران در شمال ایران) و بستان‌آباد (آذربایجان شرقی در شمال‌غرب ایران) تهیه گردید. در این تحقیق ضمن معرفی برنامه‌ریزی ژنتیک، پارامترهای ورودی که شامل درصد رس، کربن آلی و سیلت می‌باشد با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از توانایی مطلوب مدل‌های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می‌باشد. با توجه به شاخص‌های آماری به کار گرفته شده در تحقیق حاضر، مدل برنامه‌ریزی ژنتیک با جذر میانگین مربعات خطا ۱/۷۸ و ضریب تبیین ۰/۹۵ نسبت به مدل‌های دیگر دارای کارایی بالاتری بوده و قادر است نتایج قابل قبولی را ارائه نماید. هم‌چنین راه حل‌های صریحی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی باشد، بر مبنای برنامه‌ریزی ژنتیک ارائه گردیدند که این امر بر ارجحیت مدل برنامه‌ریزی ژنتیک بر مدل‌های دیگر می‌افزاید. تجزیه رگرسیون گام به گام جهت تعیین سهم هر یک از پارامترهای ورودی در مقدار گنجایش تبادل کاتیونی نشان داد که مواد آلی با داشتن ضریب تبیین ۸۴ درصد بیشترین میزان تغییرات گنجایش تبادل کاتیونی را توجیه نموده‌است و رس و سیلت به ترتیب دارای ضریب تبیین ۱۰ و ۶ درصد بوده‌اند.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی ژنتیک، خاک‌های شمال و شمال‌غرب ایران، ظرفیت تبادل کاتیونی، مدل‌های هوشمند مصنوعی

۱. گروه خاکشناسی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

۲. گروه خاکشناسی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهدتهران

۳. گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تبریز

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: shoaibimohammadreza@gmail.com

مقدمه

می‌کند. الگوریتم‌های تکاملی که براساس تئوری داروین پایه ریزی شده‌اند توانایی مدل‌سازی فرآیندهای کاملاً غیرخطی را دارند که برنامه‌ریزی ژنتیک نیز عضوی از خانواده الگوریتم‌های تکاملی می‌باشد. مزیت GP نسبت به مدل‌های دیگر از جمله شبکه‌های عصبی مصنوعی این است که در GP ابتدا ساختار بلوک‌ها (متغیرهای ورودی، هدف و مجموع توابع) تعریف شده و سپس ساختار بهینه مدل و ضرایب طی فرآیند آموزش تعیین می‌شوند درحالی‌که در شبکه‌های عصبی ابتدا باید ساختار تعیین شده و سپس ضرایب طی فرآیند آموزش حاصل می‌شوند. هم‌چنین GP به‌طور خودکار می‌تواند متغیرهای ورودی که در مدل بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب کند و این درحالی‌است که در سایر روش‌ها این امر امکان‌پذیر نیست.


سیستم استنتاج عصبی - فازی (ANFIS) شامل شبکه‌های چند لایه‌ای می‌باشد و از الگوریتم‌های یادگیری شبکه عصبی و منطق فازی به‌منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی استفاده می‌کنند. این سیستم با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی، موفقیت‌های بسیاری را در مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های پیچیده داشته‌است. سیستم ANFIS در ابتدا توسط جانگ (۱۴) معرفی گردید و از آن پس به‌عنوان یکی از ابزارهای تقریب‌ساز توابع حقیقی پیوسته (با هر مقدار دلخواه درجه دقت) در سطح جهانی مورد استفاده قرار گرفت (۱۴). این سیستم از نظر عملکرد مشابه سیستم‌های استنتاج فازی می‌باشد (۱۴). بررسی‌های زیادی به‌منظور توسعه شبکه عصبی مصنوعی صورت گرفت به‌طوری‌که امروزه شبکه عصبی با ساختارهای متفاوت به‌طور وسیعی در حوزه‌های مختلف علوم گسترش یافته‌است. شبکه‌های عصبی مصنوعی قادرند با موفقیت خصوصیات هیدرولیکی خاک را پیش‌بینی نمایند (۲۱، ۲۲). پاپچسکی و رائولز (۲۲) شبکه‌های عصبی مصنوعی را جهت تخمین منحنی رطوبتی خاک با استفاده از خصوصیات زود یافت خاک به‌کار بردند. آنها نشان دادند که شبکه‌های عصبی میزان آب را در پتانسیل‌های ماتریک انتخاب شده بهتر از رگرسیون

ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) یکی از ویژگی‌های مهم شیمیایی خاک است و در جذب و رهاسازی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و برآورد شدت جذب و رهاسازی فلزات سنگین و برخی آلاینده‌های آلی کاتیونی نقش مؤثری دارد (۹، ۵، ۲). این ویژگی شاخص خوبی برای تعیین کیفیت و بهره‌وری خاک بوده و مقدار آن بسته به میزان مواد آلی، مقدار و نوع رس و شرایط خاک متغیر است. اگرچه اندازه‌گیری ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از روش مستقیم، معمول می‌باشد، اما در مناطق خشک و نیمه‌خشک، به‌دلیل بالا بودن مقادیر زیادی از گچ، آهک و کلسیم، اندازه‌گیری این پارامتر مهم خاک با مشکلات زیادی روبروست. اگرچه ظرفیت تبادل کاتیونی را می‌توان به‌روش مستقیم اندازه‌گیری نمود ولی این اندازه‌گیری، به‌ویژه در اربدی سول‌ها به‌دلیل مقادیر بالای کلسیم و گچ موجود در خاک، سخت و پرهزینه است (۱۹ و ۱۰).

شبکه‌های عصبی مصنوعی، برنامه‌ریزی ژنتیک و سیستم استنتاج عصبی - فازی با تخمین CEC از روی داده‌های یافت خاک، یکی از روش‌های جایگزین اندازه‌گیری مستقیم CEC است. فرض اساسی در بیشتر مدل‌های تخمینی CEC وجود رابطه خطی بین پارامتر مورد نظر با مواد آلی و میزان و نوع رس موجود در خاک است (۸، ۲۰). کرو و همکاران (۱۷) با استفاده از بانک اطلاعاتی خاک‌های دانمارک و پارامترهای رس، ماده آلی، سیلت ریز و pH مدل‌هایی را برای تخمین CEC ارائه دادند.

شبکه‌های عصبی مصنوعی براساس استنباط از سیستم عصبی بیولوژیکی استوار است. در میان نمونه‌های متعدد شبکه‌های عصبی، شبکه انتشار به عقب دارای کاربرد بیشتری می‌باشد (۱۸). شبکه یادشده متشکل از لایه‌هایی است که این لایه‌ها دارای عناصری با عملکرد موازی هستند که به آنها نرون (عصب) گفته می‌شود. هر لایه کاملاً با لایه قبل و بعد از خود در ارتباط است (۱۳ و ۱۵).

برنامه‌ریزی ژنتیک یک روش برنامه‌ریزی خودکار می‌باشد که راه حل مسئله را با استفاده از برنامه‌نویسی کامپیوتری ارائه



شکل ۱. موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه

مواد و روش‌ها

مناطق مورد مطالعه

مناطق مورد مطالعه در این تحقیق چپرسر در غرب استان مازندران و بستان‌آباد در استان آذربایجان شرقی می‌باشد. چپرسر در $36^{\circ} 51' 55''$ و $36^{\circ} 51' 48''$ عرض شمالی و $46^{\circ} 50' 51''$ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. منطقه چپرسر در حد فاصل شهرستان رامسر و شهر شیروود قرار گرفته‌است. عمده کاربری اراضی این منطقه برنج‌کاری، باغات مرکبات و کیوی است. براساس میانگین آمار ۲۲ ساله ایستگاه هواشناسی رامسر (فرودگاه)، میانگین حداقل و حداکثر دمای سالیانه به ترتیب $12/8$ و $19/3$ درجه سانتی‌گراد، میانگین دما $16/1$ درجه سانتی‌گراد، میانگین بارندگی 1203 میلی‌متر، میانگین رطوبت نسبی هوا $83/4$ درصد می‌باشد. منطقه مورد مطالعه دارای رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی بودیک و در مناطقی که به‌طور طبیعی یا به‌واسطه کشت برنج سطح آب‌زیرزمینی در سطح یا نزدیکی سطح خاک وجود دارد، دارای رژیم رطوبتی آکوئیک می‌باشد. (۱)

بستان‌آباد در مرکز استان آذربایجان شرقی، در $37^{\circ} 50' 15''$ و $37^{\circ} 50' 41''$ عرض شمالی و $47^{\circ} 32' 42''$ و $47^{\circ} 32' 56''$ طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. منطقه بستان‌آباد در

تخمین می‌زند. اسچاپ و همکاران (۲۳) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی توابعی برای تخمین پارامترهای معادلات وان گنوختن، وان گنوختن-معلم و گاردنر ایجاد کردند، نتایج این محققان نشان داد که هر چه تعداد داده‌های ورودی مورد استفاده در این توابع بیشتر باشد، درستی توابع افزایش خواهد یافت. تاماری و همکاران (۲۵) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی اقدام به تخمین منحنی رطوبتی خاک کرده و کارایی بالاتر شبکه عصبی را نسبت به رگرسیون خطی تأیید کردند. امینی و همکاران (۴) با استفاده از مقدار ماده آلی و رس اقدام به برآورد میزان CEC به‌وسیله شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌های تجربی که بر پایه روش‌های رگرسیونی می‌باشند، نمودند. نتایج این محققان نشان داد که روش شبکه عصبی از برتری قابل قبولی نسبت به سایر روش‌ها برخوردار می‌باشد. براساس مطالعات نگارندگان، در مناطق یادشده به مسأله تحقیق در زمینه تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده از مدل‌های هوشمند پرداخته نشده‌است. با توجه به اهمیت تخمین این پارامتر، در تحقیق حاضر از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج عصبی - فازی و نیز برنامه‌ریزی ژنتیک برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در خاک‌های شهرستان بستان‌آباد در شهر تبریز و چپرسر مازندران استفاده به‌عمل آمد.

جدول ۱. خصوصیات آماری داده‌های مورد استفاده

کربن آلی	سیلت	رس	CEC	
			(سانتی مول بار بر کیلوگرم)	مشخصه های آماری
۰/۰۱	۴	۰	۳	حداقل
۷/۹۹	۲/۷۷	۷۳	۴۰	حداکثر
۲/۵۰۵۴	۳۶/۵۷۲	۲۹/۰۰۶	۲۲/۶۱۹	میانگین
۱/۸۰۸	۱۰/۹۱۲	۱۴/۲۵۴	۸/۱۲۱	انحراف معیار
۰/۰۱	۳/۵	۱/۵	۴/۷	حداقل
۶/۴۲	۶۰/۱	۶۸	۳۶	حداکثر
۱/۸۱۶	۳۳/۲۷	۲۸/۴	۱۹/۵۶۱	میانگین
۱/۷۶۶	۱۱/۴۲	۱۲/۶۱	۷/۹۹۵	انحراف معیار


شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)

شبکه‌های عصبی مصنوعی براساس استنباط از سیستم عصبی بیولوژیکی استوار است. این شیوه از ساختاری نرونی و هوشمند با الگوبرداری مناسب از نرون‌های موجود در مغز انسان سعی می‌کند تا از طریق توابع تعریف‌شده ریاضی رفتار درون سلولی نرون‌های مغز را شبیه‌سازی کند و از طریق وزن‌های محاسباتی موجود در خطوط ارتباطی نرون‌های مصنوعی، عملکرد سیناپسی را در نرون‌های طبیعی به مدل در آورد. این مدل براساس یادگیری فرآیند حل مسئله و به‌عبارتی رسیدن به خروجی از طریق یافتن رابطه نهفته در فرآیند مورد نظر کار می‌کند. بدین‌منظور الگو، با دسته‌ای از داده‌ها آموزش داده‌شده تا در مورد ورودی‌های جدید با توجه به رابطه پیدا شده در مرحله آموزش، خروجی مناسب را محاسبه نماید (۱۸). شبکه یادشده متشکل از لایه‌هایی است که این لایه‌ها دارای عناصری با عملکرد موازی هستند که به آنها نرون (عصب) گفته می‌شود. هر لایه کاملاً با لایه قبل و بعد از خود در ارتباط است. شکل ۲ معماری شبکه عصبی به‌کار رفته در این تحقیق را نشان می‌دهد.

حد فاصل شهرستان هشتروند و شهر تبریز قرار گرفته‌است. عمده کاربری اراضی این منطقه دیم‌کاری، زراعت غله، سیب زمینی و... است. براساس میانگین آمار ۱۸ ساله ایستگاه هواشناسی سراب، میانگین حداقل و حداکثر دمای سالیانه به ترتیب ۵/۸ و ۱۲/۴ درجه سانتی‌گراد، میانگین دما ۹/۱ درجه سانتی‌گراد، میانگین بارندگی ۲۶۷ میلی‌متر، میانگین رطوبت نسبی هوا ۵۲/۱ درصد می‌باشد. منطقه مورد مطالعه دارای رژیم حرارتی ترمیک و رژیم رطوبتی زیریک می‌باشد. موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در شکل ۱ نشان داده شده است. (۱)

نمونه‌برداری و تجزیه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

از مناطق مورد مطالعه به تعداد ۴۸۵ نمونه جمع‌آوری شد. برای اندازه‌گیری درصد ذرات خاک از روش هیدرومتری (۱۱)، کربن آلی خاک به روش والکلی بلاک (۶) و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک به روش باور (۷) استفاده گردید. در این تحقیق ۸۰٪ کل داده‌ها برای آموزش و ۲۰٪ بقیه برای تست مدل‌ها انتخاب گردید. در جدول ۱ خصوصیات آماری داده‌های مورد استفاده ارائه شده است (۳، ۱).




شکل ۳. مدل فازی مرتبه اول سوگنو با دو متغیر ورودی (x و y)

قانون آموزش موجود در سیستم، نحوه تطبیق پارامترهای مقدماتی (در لایه ۱) و پارامترهای نتیجه (در لایه ۴) را به منظور به حداقل رساندن خطا، تعیین می‌نماید. بر مبنای مراحل سعی و خطای انجام‌یافته در این تحقیق، تعداد توابع عضویت در هر مورد و برای هر یک از متغیرهای ورودی برابر با ۴ عدد در نظر گرفته شد.

برنامه‌ریزی ژنتیک

برنامه‌ریزی ژنتیک تعمیم‌یافته الگوریتم ژنتیک می‌باشد که برای اولین بار براساس تئوری داروین ارائه شد. به این ترتیب که جمعیتی در جهت تکامل به صورت انتخابی، جمعیت نامناسب را رها کرده و فرزندان اصلاح‌شده ایجاد می‌کنند. برنامه‌ریزی ژنتیک یک روش برنامه‌ریزی خودکار می‌باشد که راه حل مسئله را با استفاده از برنامه کامپیوتری ارائه می‌کند. در این روش در ابتدای فرآیند هیچ‌گونه رابطه تابعی در نظر گرفته نشده و این روش قادر به بهینه‌سازی ساختار مدل و مؤلفه‌های آن می‌باشد. برنامه‌ریزی ژنتیک بر خلاف الگوریتم ژنتیک روی ساختار درختی فرمول‌ها به جای سلسله ارقام دودویی عمل می‌کند. ساختارهای درختی از مجموعه توابع (عملگرهای ریاضی مورد استفاده در فرمول‌ها) و ترمینال‌ها (متغیرهای مسئله و اعداد ثابت) ایجاد می‌شوند (۱۶). قبل از مراحل اجرایی برنامه‌ریزی ژنتیک گام‌های مقدماتی زیر باید توسط کاربر تعیین شوند.



شکل ۲. نمایی از ساختار شبکه عصبی مصنوعی با لایه‌های ورودی رس، سیلت، کربن آلی و لایه خروجی ظرفیت تبادل کاتیونی

سیستم استنتاج عصبی- فازی (ANFIS)

این مدل شامل شبکه‌های چند لایه‌ای می‌باشند و از الگوریتم‌های یادگیری شبکه عصبی و منطق فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی استفاده می‌کنند. این سیستم با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی، موفقیت‌های بسیاری را در مدل‌سازی و کنترل سیستم‌های پیچیده داشته‌است. سیستم ANFIS در ابتدا توسط جانگ (۱۳) معرفی گردید و از آن پس به‌عنوان یکی از ابزارهای تقریب ساز توابع حقیقی پیوسته (و با هر مقدار دلخواه درجه دقت) در سطح جهانی مورد استفاده قرار گرفت (۱۴ و ۱۲). یک سیستم استنتاج فازی با دو متغیر ورودی X و Y و یک متغیر خروجی f در نظر گرفته می‌شود. مدل فازی مرتبه اول سوگنو، که شامل دو قانون فازی "اگر - آنگاه" می‌باشد، می‌تواند به صورت زیر نشان داده شود:


قانون اول: اگر X برابر A_۱ و Y برابر B_۱ باشد آنگاه

$$f_1 = p_1x + q_1y + r_1 \quad [1]$$

قانون دوم: اگر X برابر A_۲ و Y برابر B_۲ باشد آنگاه

$$f_2 = p_2x + q_2y + r_2 \quad [2]$$

سیستم فازی حاصل در شکل ۳ نشان داده شده‌است. در این‌جا متغیر f خروجی عبارت از میانگین وزنی خروجی‌های مربوط به هر یک از قانون‌های یاد شده می‌باشد.



شکل ۴. مروری بر شکل کلی گام‌های اجرایی برنامه‌ریزی ژنتیک (۲۴)

مصنوعی، برنامه‌ریزی ژنتیک و سیستم استنتاج عصبی- فازی استفاده شد. GP دارای توان انتخاب متغیرهای مؤثر در مدل و حذف متغیرهایی که تأثیر کمتری دارند، می‌باشد. در شکل ۴ گام‌های اجرایی برنامه‌ریزی ژنتیک ارائه شده است.

برای مدل سازی مقادیر CEC بر اساس شبکه عصبی از نرم افزار Qnet استفاده گردید. جهت مدل سازی مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی بر اساس برنامه‌ریزی ژنتیک از نرم افزار GeneXproTools 4.0 استفاده شد. مدل سازی مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی بر اساس سیستم استنتاج عصبی- فازی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گردید.

۲-۶- معیارهای ارزیابی


در این تحقیق برای ارزیابی توانایی و دقت مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج عصبی- فازی و برنامه‌ریزی ژنتیک، در برآورد مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی براساس داده‌های درصد کربن آلی، رس و سیلت از شاخص‌های ضریب تبیین و مجذور میانگین مربعات خطا استفاده شده است.

۱- مجموعه ترمینال‌ها (متغیرهای مسئله، اعداد ثابت تصادفی)،
 ۲- مجموعه عملگرهای ریاضی مورد استفاده در فرمول‌ها، ۳-
 انتخاب تابع برازش، برای سنجش برازش فرمول‌ها، ۴- تعیین پارامترهای کنترل‌کننده اجرای برنامه (اندازه جمعیت، احتمال مربوط به به‌کارگیری عمل‌های ژنتیکی و جزئیات دیگر مربوط به اجرای برنامه) و ۵- معیار پایان و ارائه نتایج اجرای برنامه (مثل، تعداد تولید جمعیت جدید، تعیین یک مقدار مشخص برای برازش فرمول‌ها که اگر میزان برازش برابر یا بیشتر از آن مقدار شد، اجرا متوقف شود). فرآیند اجرایی گام‌به‌گام برنامه‌ریزی ژنتیک به صورت مراحل زیر است: ۱- تولید یک جمعیت اولیه از فرمول‌ها که این فرمول‌ها از ترکیب تصادفی مجموعه توابع (عملگرهای ریاضی مورد استفاده در فرمول‌ها) و ترمینال‌ها (متغیرهای مسئله و اعداد ثابت) ایجاد می‌شوند، ۲- هر یک از افراد جمعیت مذکور با استفاده از توابع برازش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، ۳- تولید یک جمعیت جدید از فرمول‌ها
 برای مدل‌سازی مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی از شبکه‌های عصبی

جدول ۲. مؤلفه‌های آماری مربوط به مدل‌های مختلف تخمین CEC

شاخص‌های آماری				مدل
تست		آموزش		
RMSE (cmolc. kg ⁻¹)	R ²	RMSE (cmolc. kg ⁻¹)	R ²	
۲/۱۲	۰/۹۳	۲/۲۳	۰/۹۲	ANN
۱/۹۴	۰/۹۵	۱/۹۷	۰/۹۴	NF
۱/۷۸	۰/۹۵	۲/۱۳	۰/۹۳	GP

Sub-ET 1



Sub-ET 2



شکل ۵. ساختار درختی مدل برنامه‌ریزی ژنتیک

دقت قابل قبولی برخوردار است و لذا می‌توان آن را در تخمین میزان ظرفیت تبادل کاتیونی به کار بست. لازم به ذکر است که بعد از این مدل، مدل استنتاج عصبی - فازی نیز نتایج قابل قبولی دارد.

معادله ارائه شده توسط برنامه‌ریزی ژنتیک برای تخمین میزان CEC خاک بر مبنای داده‌های مقادیر رس، سیلت و مواد آلی خاک به شکل زیر خواهد بود: [۳]

$$CEC = \text{Sqrt}(((O.C * (5.362182 + O.C)) - (O.C - \text{Clay}))) + O.C \\ + \text{Sqrt}((((\text{Silt} + \text{Clay}) * O.C) - (((6/-0.05218) + O.C) - \text{Clay})))$$


تجزیه رگرسیون گام به گام جهت تعیین سهم هر یک از پارامترهای ورودی در مقدار CEC نشان داد که مواد آلی با

ساختار درختی مدل برنامه‌ریزی ژنتیک به دست آمده در شکل ۵ ارائه شده است.

نتایج و بحث

نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد که مدل‌های مورد بررسی دارای ضریب تبیین بالا و خطای تخمین بسیار کمتری هستند. در بین مدل‌های مورد بررسی، مدل برنامه‌ریزی ژنتیک دارای ضریب تبیین ۰/۹۵ و جذر میانگین مربعات خطای، ۱/۷۸ (سانتی مول بار بر کیلوگرم) از سایر مدل‌ها بهتر بوده است.

شکل ۶ مقادیر مشاهداتی و تخمینی ظرفیت تبادل کاتیونی را نشان می‌دهد. باتوجه به جدول ۲ و نمودارهای نشان داده شده در شکل ۶، می‌توان دریافت که مدل برنامه‌ریزی ژنتیک از






شکل ۶. مقادیر مشاهداتی و تخمینی CEC (سانتی مول بار بر کیلوگرم) خاک با کاربرد مدل های برنامه ریزی ژنتیک

که از نوع جعبه سیاه می باشند هیچ گونه اطلاعی از وضعیت رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی حاصل نمی شود، ولی برنامه ریزی ژنتیک می تواند چنین رابطه ای را شناسایی و ارائه دهد.




کارایی مدل ارائه شده در این تحقیق در خاک های برخی مناطق ایران مورد ارزیابی قرار گرفت، از جمله صحت سنجی ۳۰ نمونه خاک مطالعه شده در هر یک از مناطق شالیزاری شرق گیلان (۱)، حاشیه بزرگراه تهران-قم (۳) و اراضی سوده جان در استان چهارمحال و بختیاری (۲) نشان داد که میزان ضریب تبیین آنها به ترتیب ۰/۹۳، ۰/۸۴ و ۰/۸۵ و ریشه دوم میانگین مربعات خطا در هر یک از مناطق فوق به ترتیب ۲/۰۲، ۲/۴۳ و ۲/۳۸ سانتی مول بار بر کیلوگرم بوده است.

داشتن ضریب تبیین ۸۴ درصد بیشترین میزان تغییرات CEC را توجیه نموده است و رس و سیلت به ترتیب دارای ضریب تبیین ۱۰ و ۶ درصد بوده اند.

این مطالعه نشان داد که برنامه ریزی ژنتیک و تا حدودی نیز سیستم استنتاج عصبی- فازی نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی دارای کارایی بهتری است. در حالت کلی می توان اظهار داشت که کاربرد مدل های هوشمند در مدل سازی و تخمین مقادیر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از دقت بالایی برخوردار است و لذا می توان با اطمینان بیشتری از روش های یاد شده به منظور انجام مدل سازی و تخمین های مورد نظر بهره برد و در این میان، ارائه راه حل صریح توسط مدل های برنامه ریزی ژنتیک، بر مطلوبیت این مدل ها می افزاید. در مدل های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی- فازی



شکل ۷. مقادیر مشاهده‌ای و تخمینی CEC (سانتی مول بار بر کیلوگرم) خاک با کاربرد مدل‌های سیستم عصبی - فازی



شکل ۸. مقادیر مشاهده‌ای و تخمینی CEC (سانتی مول بار بر کیلوگرم) خاک با کاربرد مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی

نتیجه گیری

به عنوان مدل های قابل قبول تخمین CEC خاک معرفی نمود. مدل های مبتنی بر برنامه ریزی ژنتیک راه حل های صریحی ارائه می نمایند که بر مبنای آنها می توان رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی را مشخص نمود. در این تحقیق چنین رابطه ی صریحی برای تخمین میزان CEC خاک ارائه گردید.

در تحقیق حاضر از روش شبکه های عصبی مصنوعی، استنتاج عصبی- فازی و برنامه ریزی ژنتیک به منظور تخمین مقدار CEC خاک استفاده گردید. بر پایه محاسبات انجام یافته، مدل های هوشمند دارای توانایی قابل توجهی در تخمین میزان CEC خاک بوده و لذا با اطمینان کافی می توان از آنها در تخمین مقادیر CEC خاک بهره برد. در حالت کلی می توان هر سه مدل را

منابع مورد استفاده

۱. ترابی، حسین. ۱۳۸۰. پیدایش، طبقه بندی و ارزیابی تناسب کمی و اقتصادی اراضی خیس، برای کشت برنج در شرق استان گیلان، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۲. سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری. ۱۳۸۷. مطالعات خاک شناسی نیمه تفصیلی دقیق اراضی سودجان، مهندسین مشاور سامان آبراه.
۳. عزیزی، پیمان. ۱۳۸۹. بررسی تشکیل، تحول و رده بندی خاک های حاشیه بزرگراه تهران- قم و ارزیابی تناسب اراضی برای ایجاد فضای سبز مناسب. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
4. Amini, M., K.C. Abbaspour, H. Khademi, N. Fathianpour, M. Afyuni and R. Schulin. 2005. Neural network models to predict cation exchange capacity in arid regions of Iran. *Euro. J. Soil Sci.* 53: 748-757.
5. Bell, M.A. and H. Van Keulen. 1995. Soil pedotransfer functions for four Mexican soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 59: 865-871.
6. Black, C.A. 1982. Method of soil analysis, Chemical and microbiological properties, American Society of Agronomy, INC. 2: 1965.
7. Bower, C.A. R.F. Reitmeir and M. Fireman. 1952. Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. *Soil Sci.* 73: 251-261.
8. Breeuwsma, A., J.H.M. Wosten, J. J. Vleeshouwer A.M. Van Slobbe and J. Bouma. 1986. Derivation of land qualities to assess environmental problems from soil surveys. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 50: 186-190.
9. Carpena, O., A. Lux and K. Vahtras. 1972. Determination of exchangeable Cations in calcareous soils. *Soil Sci.* 33: 194-199.
10. Fernando, M.J. R.G. Burau and K. Arulanandam. 1977. A new approach to determination of cation exchange capacity. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 41: 818-820.
11. Gee, G. and W. Bauder. 1986. Particle size distribution analysis. In: Klute, A. (Ed.), *Method of soil analysis. Part 1*, 2^{ed}. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. 383-411.
12. Haykin, S. 1998. *Neural Networks: a Comprehensive Foundation*. Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 842.
13. Jang, J.S.R. 1993. ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. *IEEE Trans. Syst. Manag. Cyber.* 23(3): 665-685.
14. Jang, J.S.R., C.T. Sun and E. Mizutani. 1997. *Neurofuzzy and soft computing: a computational approach to learning and machine intelligence*. Prentice-Hall, New Jersey.
15. Kimar, M., N.S. Raghuvanshi, R. Singh, W. Wallender and W. Pruitt. 2002. Estimating evapotranspiration using artificial neural network. *J. Irri. Drain. Engine* 128: 4. 224-233.
16. Koza JR, 1992. *Genetic programming: On the programming of computers by means of natural selection*. Cambridge, MA: MIT Press.
17. Krogh, L., H. Breuning-Madsen and M.H. Greve. 2000. Cation exchange capacity pedotransfer function for Danish soils. *Plant Soil* 50: 1-12.
18. Lippman, R. 1987. An introduction to computing with neural nets. *IEEE ASSP Mag.* 4: 4-22.
19. Manrique, L.A., C.A. Jones and P.T. Dyke. 1991. Predicting cation exchange capacity from soil physical and chemical properties. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 50: 787-794.

20. McBratney, A.B., B. Minasny, S.R. Cattle and R.W. Vervoort. 2002. From pedotransfer functions to soil inference systems. *Geoderma* 109: 41-73.
21. Minasny, B. and A.B. McBratney. 2002. The Neuro-m method for fitting neural network parametric pedotransfer functions. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 66: 352-361.
22. Pachepsky, Y.A. and W.J. Rawls. 1999. Accuracy and reliability of pedotransfer functions as affected by grouping soils. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 63: 1748-1757.
23. Schaap, M.G., F.J. Leij and M.Th. Van Genuchten. 1998. Neural network analysis for hierarchical prediction of soil hydraulic properties. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 62: 847-855.
24. Sette S, L. Boullart. 2001. Genetic programming: principles and applications. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 14: 727-736.
25. Tamari, S., J.H.M. Wosten and J.C. Ruz-suarez. 1996. Testing an artificial neural network for predicting soil hydraulic conductivity. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 60: 1732-1741.